



Godkänt: 2018-05-03  
Giltigt t.o.m: 2021-05-03

Ver.nr: 1.0  
Dnr:

## Ultraljud bukaorta remittent

---

### Indikation/frågeställning

Undersökningen visar storleken av aorta, eventuella utbuktningar, bråck (aneurysm) och dessas utseende. Således kan man oftast bedöma eventuell trombotisering medan det kan vara svårare att fastställa eventuell dissektion. Ett aneurysms längdutbredning nedåt, mot bifurkationen, brukar relativt lätt kunna bedömas medan det kan vara svårare att bedöma relationen till njurartärer.

Ultraljundsundersökning lämpar sig ofta väl för storlekskontroll av kända aneurysm. Postoperativa kontroller efter öppen eller endovaskulär (EVAR) operation av aneurysm görs ofta med ultraljud.

I akutfall är DT förstahandsmetod vid klinisk misstanke på ruptur/dissektion.

### Kontraindikation

-

### Remissinnehåll

-

### Patientförberedelser

Patienten ska vara fastande minst 4 timmar före undersökningen

### Kontrastmedel/läkemedel

-

### Undersökningsutförande

Undersökningen tillgår så att läkaren för ultraljundsapparatens ljudhuvud över huden. Kontaktgel/kräm används.

### Eftervård

-