



Godkänt: 2018-05-03
Giltigt t.o.m: 2021-05-03

Ver.nr: 1.0
Dnr:

Ultraljud lilla bäckenet nedre buk urinblåsa remittent

Indikation/frågeställning

Ultraljudsundersökning av lilla bäckenet med gynekologisk frågeställning utförs inte på röntgenavdelningen utan på kvinnoklinikens ultraljudsavdelning. Remiss sänds således dit.

Vad gäller barn måste detta anpassas efter ålder och är ofta ej genomförbart. Transabdominella undersökningar av flickor för eventuell bedömning av missbildningar utförs ibland på röntgenavdelningen.

Undersökning av urinblåsan i sig kan vara aktuell vid bedömning av eventuell blåstumör, blåsstorlek efter vattenkastning (residualurin) samt för att se blåstenar.

I övrigt undersöks lilla bäckenet vid misstanke om appendicit (barn och yngre vuxna, smala patienter), abscess eller vid tumörmisstanke, men i dessa fall är ofta datortomografi förstahandsmetod.

Kontraindikation

-

Remissinnehåll

-

Patientförberedelser

För att se urinblåsan och dess omgivning ska blåsan vara fylld. Patienten ska därför hålla urin de närmaste två timmarna före undersökningen.

Kontrastmedel/läkemedel

-

Undersökningsutförande

Undersökningen tillgår så att läkaren för ultraljudsapparatens ljudhuvud över huden. Kontaktgel/kräm används.

Eftervård

-