



Godkänt: 2018-05-03
Giltigt t.o.m: 2021-05-03

Ver.nr: 1.0
Dnr:

Ultraljud pankreas bukspottkörtel remittent

Indikation/frågeställning

För att minska mängden störande gas i tarmsystemet skall patienten inte ha ätit på fyra timmar.

Vid punktion eller biopsi v.g. se speciellt avsnitt.

Ultraljudsundersökning av bukspottkörteln ger i bästa fall upplysning om dess utseende men ej om dess funktion.

Dessvärre händer det ibland att delar av eller t o m hela körteln undandrar sig bedömning på grund av skymmande strukturer, vanligen tarmgas.

Ibland kan det löna sig att försöka igen men ofta kvarstår samma problem vid den andra undersökningen.

De förändringar som kan ses är t ex tumörförändringar eller inflammatoriska förändringar. De senare ger i måttligt uttalade fall endast en förändring av körtelns allmänna ekoegenskaper och då normalvariationen är stor i det avseendet är lättare pankreatiter svåra att diagnostisera.

Tumörförändringar kan vara lätta att se men ibland försvåras undersökningen av faktorer enligt ovan (gas etc).

Inflammatoriska följdverkningar typ cystor och förkalkningar kan ses. Om de senare är uttalade kan de dock omöjliggöra bedömning av körteln i övrigt.

Kontraindikation

-

Remissinnehåll

-

Patientförberedelser

-

Kontrastmedel/läkemedel

-

Undersökningsutförande

Undersökningen tillgår så att röntgenläkaren för ultraljudsapparatens ljudhuvud över huden. Kontaktgel/kräm används.

Eftervård

-