



Godkänt: 2018-05-03
Giltigt t.o.m: 2021-05-03

Ver.nr: 1.0
Dnr:

Ultraljud testiklar remittent

Indikation/frågeställning

Utförs framför allt för att bedöma palpabla förändringar. Ultraljud kan skilja mellan intra- och extratestikulära förändringar. Ultraljud kan skilja mellan solida och cystiska (vätskeförande) förändringar. Ultraljud kan således väl skilja ut intratestikulära solida förändringar även om artdiagnos sällan kan ställas. Dessa förändringar måste dock misstänkas vara elakartade tills motsatsen bevisats. Likaså kan ultraljud skilja ut de förändringar som ligger utanför testikeln och således ej ger misstanke om testikelcancer. Att artbestämma dessa förändringar låter sig ej heller alltid göras. Vid misstänkt testistorsion får ej ultraljud fördröja exploration. Det förekommer dock intermittenta torsioner med mer atypiskt förlopp och symtom där ultraljud kan vara av värde både för bedömning av nedsatt/utebliven cirkulation såväl som hyperemi (ökad cirkulation) efter torsion, som släppt. Däremot kan ultraljud för bedömning av cirkulation med fördel göras vid trauma mot scrotum. Epididymit/orchit kan också bedömas.

Kontraindikation

-

Remissinnehåll

-

Patientförberedelser

Inga förberedelser.

Kontrastmedel/läkemedel

-

Undersökningsutförande

Undersökningen utförs av röntgenläkare som för ultraljudsapparatens ljudhuvud över pungen. Kontaktgel/kräm används.

Eftervård

-