

Hud- och sårinfektioner hos personal

Hud- och sårinfektioner orsakas främst av staphylococcus aureus och betahemolytiska streptokocker grupp A. Infekterade sår, även om de är små, kan vara en smittkälla för infektioner.

Vårdpersonal med en pågående sårinfektion utgör en smittrisk för patienter.

Kontaktsmitta (direkt, indirekt) via händerna är den vanligaste smittvägen. Direkt kontaktsmitta från ett infekterat sår, en nagelbandsinfektion eller dyl. utgör den största smittrisen. Observera att handskar inte förhindrar smittspridning från infekterade sår på händerna.

Råd för att förhindra smittspridning

- Om du har infekterade sår på fingrar (inkl. nagelband), hud eller händer skall du alltid rapportera detta till din arbetsledare som bedömer vilka åtgärder som ska vidtas. För vårdpersonal med pågående sårinfektion kan det i många fall vara olämpligt att arbeta. Ställningstagande sker efter individuell bedömning
- Den som arbetar med livsmedelshantering får inte ha någon infektion som medför risk för att smitta sprids till livsmedel. Personer med infekterade sår på händerna ska därför inte hantera oförpackade livsmedel. Detsamma gäller vid annan hudinfektion där det finns risk för direkt eller indirekt kontaminering
- För personal med kroniska hudlesioner bör denne ta kontakt med sin vårdcentral

Multiresistenta bakterier

Personal med sår, eksem eller andra hudlesioner har ökad risk att bli koloniserade med S. aureus och ska därför inte vårda patienter med MRSA (meticillinresistenta Staphylococcus aureus).

Personal som arbetat inom vården (gäller även vårdstuderande) eller själva fått sjukvårdande behandling utanför Norden senaste 6 månaderna skall screenas avseende MRSA. I avvaktan på odlingssvar bör personal med sår eller andra kroniska hudlesioner inte arbeta i patientnära vård.

Vid tveksamhet eller förfrågningar, kontakta Vårdhygien.

023-49 03 22, 023-49 06 23, 023- 49 02 75, 023-49 02 76