

## Röntgen pyelografi retrograd remittent

---

### Dosklass II



Dosklass II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

### Indikation/frågeställning

- Konkrement
- Avflödeshinder
- Tumör
- Striktur
- Retroperitoneal fibros
- Postoperativa kontroller
- Deviationer

### Kontraindikationer

Kontrastmedelsöverkänslighet relativ kontraindikation. Premedicinering.

### Remissinnehåll

- Ange om katetern får tas bort eller om den ska ligga kvar (postoperativa fall).
- Kända konkrement och passageförhållanden. Smärtor. Feber. CRP-värde. Hematuri. Tumörmisstanke.
- Är patienten opererad tidigare och vad har gjorts. Använd inte bara förkortningar.

### Patientförberedelser

Via urinblåsan inlagd uretärkateter.

### Kontrastmedel/läkemedel

Vattenlösligt jodbaserat kontrastmedel. (Se vidare om kontrastmedelsreaktioner under kontrastmedel)

### Utförande

Under genomlysning och bildtagning sprutas kontrast in via uretärkatetern för framställning av kalyces, njurbäcken och uretär samt övergång till urinblåsan. Undersökes i liggande samt i halvstående ställning. I flertalet fall drar röntgen katetern.

## Eftervård -