

Godkänt  
2022-06-09Giltigt t.o.m  
2025-06-09Versionsnummer  
1.0

Diarienummer

## Smittskyddsåtgärder vid fall av meticillinresistent *Staphylococcus argenteus*

---

Meticillinresistent *Staphylococcus argenteus* liknar på många sätt MRSA (meticillinresistent *Staphylococcus aureus*) men omfattas inte av smittskyddslagen och patienten har därmed inga förhållningsregler. Smittskydd och vårdhygien Dalarna rekommenderar att följande smittskyddsåtgärder görs när meticillinresistent *Staphylococcus argenteus* upptäcks i en odling:

- 1) Börja med en ny MRSA-screening för att se om det kan röra sig om transient bärarskap hos patienten. Om odlingen blir negativ görs inget mer. Observera, om patienten har sårinfektion orsakad av meticillinresistent *Staphylococcus argenteus* räknas det inte som transient bärarskap och en ny odling i närtid behövs ej, gå direkt till punkt 2 nedan.
- 2) Om screeningen blir positiv märks journalen enligt följande: "Bärare av meticillinresistent *Staphylococcus argenteus*. Patienten har inga förhållningsregler men bör vårdas enligt MRSA-rutin". Dessutom behöver patienten informeras om att fortsatt meddela vårdgivare om bärarskap, för att vid behov få rätt antibiotikabehandling. Patienten behöver få en ansvarig läkare på infektionskliniken som beslutar om fortsatt provtagning och avskrivning, remiss skrivs till infektionsmottagningen. Bärarskapet kan avskrivas efter tre negativa odlingar under ett år (precis som vid MRSA).

Vid ineliggande vård eller vid mottagningsbesök, se rutiner för MRSA i dokumentet [Multiresistenta bakterier handläggning i öppen- och slutenvård](#)