

Bilaga 2 Sederingsfraser

Exempel på text som rutinmässigt kan läggas in i daganteckning inför och vid sedering.

Färgkodad anteckning för att lättare kunna hitta tidigare anteckning.

De rubriker som ej är aktuella i frasen "Inför sedering" tas bort från frasen vid respektive tillfälle. Frasen "Sedering Midazolam" vid sederinstillfälle.

Inför sedering

Allmän anamnes:

Hjärt- och cirkulationssjukdom

Respirationssjukdom

Blödningsjukdom

Nerv/ muskelsjukdom

Allergi

Begåvningshandikapp

Psykisk sjukdom

Gravid

Kontraindikation för generell anestesi

Nyligen genomgått öronoperation

Någon i släkten har reagerat negativt vid narkos

Porfyri i familjen

Behandlande läkare kontaktad

Aktuell medicinering: xx

Speciell anamnes:

Tidigare odontologisk behandling under sedering: ja/nej

Preparat:

Preoperativ bedömning:

Riskgruppering enligt ASA...

Fullt frisk

Lättare medicinska eller kirurgiska sjukdomstillstånd

Allvarliga sjukdomstillstånd

Avancerade sjukdomstillstånd

Anestesiolog kontaktad: ja/nej

Indikationer:

Behandlingsomognad (t.ex låg ålder, sen utveckling, bristande uthållighet)

Generell rädsla

Rädsla baserad på tidigare negativ erfarenhet tandvård/sjukvård

Spruträdsla

Behandling som kräver generell analgesi

Omfattande behandling (behandling flera kvadranter, vissa kirurgiska ingrepp)

Behandling som underlättas av sedering

Uttalade kväljningsbesvär

Muskeltonusstörningar

Övrigt:

xx

Vårdnadshavare informerad om sederingsmekanismer och efterförlopp:

ja/nej

Informerat om matkarens 4 resp 2 timmar: ja/nej

Info analgetika:

Sedering Midazolam:

Matkarens: ja/nej

Preoperativ analgetika:

Dosering: 0,4 mg/kg kroppsvikt

Administrerad Midazolam: XXml Midazolam xxmg/ml adm per os/rektalt

Syremättnad före sedering: %

Syremättnad vid max sedering: %

Syremättnad vid avslutad behandling: %

Sederingsgrad:

Acceptansgrad:

1-accepterar ej sedering eller tandbehandling

... Fortsatt behandling utförs:

2-behandlingen går att genomföra med, men med vissa svårigheter

3-behandlingen går att genomföra utan svårigheter

Postoperativ observation:

Komplikationer (t.ex. illamående, kräkningar, huvudvärk, hyperventilation, orostillstånd, översedering, hicka, dubbelseende):

Övrigt: