



Vätskebrist och läkemedel

Läkemedelsjusteringar vid dehydrering

Läkemedelsjusteringar vid dehydrering/vätskebrist

Vid dehydrering (eller risk för dehydrering) bör läkemedelsbehandlingen ses över. Vanliga orsaker är diarré, kräkningar, dåligt vätskeintag, feber eller värmebölja. Nedanstående lista är ett hjälpmedel för att identifiera patienter med sådan läkemedelsbehandling som kan behöva ses över i samband med vätskebrist. Listan på preparat är ej fullständig, använd FASS. Informationen är vägledande och individuell bedömning bör göras. Ansvarig läkare ska konsulteras kring läkemedelsändringar.

Läkemedel där tillfälligt uppehåll bör göras vid risk för vätskebrist

Läkemedelsgrupp	Exempel på preparat
Diabetesmedel ➤ <i>Följ upp blodsocker och födointag</i>	• Metformin samt kombinationer • Sulfonureider och liknande preparat: glimepirid, repaglinid • GLP1-agonister: dulaglutid (<i>Trulicity</i>), liraglutid, (<i>Diaviv</i>), semaglutid (<i>Ozempic</i>, <i>Rybelsus</i>). • SGLT2-hämmare: empagliflozin (<i>Jardiance</i>), dapagliflozin (<i>Forxiga</i>)
Hjärta och kretslopp ➤ <i>Följ upp blodtryck, puls, försämrad hjärtsvikt</i>	• ACE-hämmare samt kombinationer: enalapril, ramipril • Angiotensinreceptorblockare samt kombinationer: kandesartan, losartan, valsartan, sakubitril + valsartan (<i>Entresto</i>) • Diuretika: furosemid, bumetanid (<i>Burinex</i>) eplerenon (<i>Inspira</i>), spironolakton, bendroflumetiazid (<i>Salures</i>), hydroklortiazid, metolazon • Digitalis: digoxin
Neuroleptika	• Litium: lithionit, litarex, litiumkarbonat
Antiinflammatoriska och antireumatiska medel samt analgetika	• Cox-hämmare: diklofenak, ibuprofen, naproxen, celecoxib (<i>Celebra</i>), etoricoxib (<i>Arcoxia</i>) • Acetylsalicylsyra i smärtdosering (<i>Treo</i>, <i>Bamyl</i>, <i>Aspirin</i>)

Läkemedel där uppehåll inte bör göras vid risk för vätskebrist

Läkemedelsgrupp	Exempel på preparat
Analgetika	gabapentin, pregabalin (<i>Lyrica</i>)
Antiepileptika ➤ Dosen kan behöva ändras ➤ Koncentrationsbestämning kan behövas	karbamazepin (<i>Tegretol</i>), oxkarbazepin (<i>Trileptal</i>), valproinsyra (<i>Ergenyl</i> , <i>Absenor</i>), lamotrigin, levetiracetam (<i>Keppra</i>)
Antikoagulantia ➤ Dosen kan behöva ändras	DOAK: apixaban (<i>Eliquis</i>), dabigatran (<i>Pradaxa</i>), edoxaban (<i>Lixiana</i>), rivaroxaban (<i>Xarelto</i>) Warfarin (<i>Waran</i>) Hepariner: <i>Fragmin</i> , <i>Innohep</i> Trombocythämmare: acetylsalisylsyra (<i>Trombyl</i>), klopido­grel (<i>Plavix</i>), tikagrelor (<i>Brilique</i>)
Diabetesmedel ➤ Dosen kan behöva ändras ➤ Följ blodsockret	Insuliner
Immunsuppressiva medel ➤ Kontakta specialistmottagning	ciklosporin (<i>Sandimmun</i>), takrolimus (<i>Adport</i> , <i>Prograf</i>)
Hjärta och kretslopp ➤ Dosen kan behöva minskas ➤ Följ blodtryck och puls	Betablockerare: metoprolol, bisoprolol, atenolol, carvedilol
Medel vid parkinsonism	levodopa
Kortikosteroider för systemiskt bruk ➤ Dosen kan behöva ökas	prednisolon, betametason
Thyreoideabehandling	levotyroxin (<i>Levaxin</i> , <i>Euthyrox</i>)



Region Dalarna ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur.

Regionen arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.



Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27, Falun
www.regiondalarna.se