



Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!



Region Dalarna
Box 712
791 29 Falun
Vasagatan 27, Falun

www.regiondalarna.se



Viktig information om ditt läkemedel SGLT2-hämmare

Mitt läkemedel heter:

Telefonnummer till min vårdgivare:

Dalarnas diabetesråd
2019-09



Till dig som fått ett läkemedel ur gruppen SGLT2-hämmare

Vad heter dessa läkemedel?

- Jardiance
- Forxiga
- Invokana
- Steglatro
- Synjardy
- Xigduo
- Glyxambi
- Qtern
- Segluromet
- Steglujan
-

Varför har jag fått läkemedlet?

Läkemedlen har funnits i flera år för behandling av diabetes typ 2. Deras blodsockersänkande effekt fås genom att man utsöndrar socker via urinen. De senaste åren har de fått extra stor uppmärksamhet då stora studier visat ytterligare positiva effekter.

Positiva effekter av SGLT2-hämmare:

- viss viktnedgång.
- mycket låg risk för allvarlig hypoglykemi (lågt blodsocker).
- extra gynnsam effekt hos patienter med hjärt- kärlsjukdom, kan förebygga både dödlighet i hjärt-kärlsjukdom och försämring av hjärtsvikt.
- kan förebygga njurkomplikationer.

Vad behöver jag känna till när jag tar dessa läkemedel?

Tillfälligt uppehåll rekommenderas vid följande tillfällen:

- vid risk för uttorkning när du har magsjuka eller diarré samt vid extremt varmt väder under en längre tid.
- om du fastar under en längre tid t ex under Ramadan.
- om du under en längre tid äter extrem lågkolhydratkost (LCHF-kost).
- om du har en allvarlig infektion med hög feber. I synnerhet bör du söka akut vård om febern även åtföljs av svår smärta, hudrodnad eller svullnad i underlivet.
- inför operation: läkemedlet skall inte tas på operationsdagens morgon. Dagen efter går det i allmänhet bra att börja igen. Om du känner dig osäker fråga personalen.
- en *mycket sällsynt* komplikation är så kallad diabetesketoacidosis eller syraförgiftning. Det är ett tillstånd som gör att surhetsgraden i blodet sjunker och det kan bli mycket allvarligt. Du bör sluta med läkemedlet och kontakta läkare, diabetessjuksköterska eller Vårdguiden 1177 om du drabbas av symtom som kan tyda på syraförgiftning. Dessa är: allmän sjukdomskänsla, kraftig törst, illamående, buksmärter, kräkningar, onormal trötthet, omtöckning, svårighet att andas. Personens utandningsluft luktar aceton.

Läkemedlen rekommenderas inte:

- om du tidigare haft fotsår.
- om du har njursvikt.