

MRT rektum remittent

Dosklass 0



Ingen strålrisk

Indikation/frågeställning

Rektalcancer. Perianala fistlar. Endast remiss från kirurg eller gastroenterolog.

Kontraindikationer

Absoluta

- Icke-MR-kompatibel pacemaker/ICD.
- Magnetiska aneurysmklämmor i hjärnan
- Metallsplitter i ögonen
- Insulinpump
- Cytostatikapump
- Nervstimulator
- Cochleaimplantat (hörselprotes)

Relativa

- Patient som ej kan ligga stilla
- Inopererad metall i eller nära undersökningsområdet
- Graviditet (hittills ingen känd risk påvisad med MRT vid graviditet men vår praxis är att avstå från MRT tills efter graviditeten om det inte föreligger mycket stark indikation för undersökning)
- Kraftig övervikt
- Klaustrofobi

Remissinnehåll

Tumörens nedersta begränsning från yttre analöppningen. Tumörens position i tarmväggen, längd, grad av fixation till omgivande strukturer.

Fistlarnas läge, dx/sin, mynningar. Tidigare operationer.

Patientförberedelser

Fasta 4 tim. Microlax.

Kontrastmedel

-

Läkemedel

Boscopan el. Glucagon im.

Utförande

Eftervård

-