

Godkänt
2021-01-26
Giltigt t.o.m
2024-01-26

Versionsnummer
4.0
Diarienummer

Förebygg smittspridning mellan anställda med anledning av covid-19

Covid-19 har visat sig smitta mellan anställda på arbetsplatser i sjukvården. Det är viktigt att vidta åtgärder som förebygger spridning av covid-19 mellan personal.

-
- En anställd som är sjuk ska stanna hemma.
 - Fysiskt avstånd på minst 2 mellan personalen hålls så långt det är möjligt.
 - När personal inte kan hålla ett avstånd på minst 2 meter till varandra används munskydd (tex vid rond/rapportering/arbete på en expedition). Syftet är att om möjligt ytterligare minska risken för smittspridning mellan personal, som i sin tur riskerar att smitta patienter.
 - Säkerställ att alla anställda förstår att handhygien med tvål och vatten eller alkoholbaserat handdesinfektionsmedel ska användas ofta även utanför patientvården. Detta för att t.ex. hindra smittspridning via gemensamma tag/kontaktytor och livsmedel i personalrum.
 - Påminn regelbundet om att flergångs skyddsutrustning, såsom visir och skyddsglasögon, behöver desinfekteras noggrant mellan användningarna.
 - Öka gärna upp städfrekvens på personaltoaletter och lägg till rutiner för regelbunden avtorkning av tag/kontaktytor i lokaler som delas av flera i personalen (till exempel lunchrum, rapportrum mm). Använd alkoholbaserat ytdesinfektionsmedel med tensid/rengörande verkan.
 - Hostetikett gäller även på arbetsplatsen. Hosta i armveck eller helst i engångsnäsduk som kasseras. Handdesinfektion direkt efter.
 - Avråd anställda att dela personlig utrustning eller ägodelar eftersom de kan vara kontaminerade av mikroorganismer (till exempel mobiltelefoner).