RIKTLINJE

Godkänt	Versionsnummer
2022-01-24	9.0
Giltigt t.o.m	**Diarienummer**
2023-01-24	

Screening för covid-19 av patienter i slutenvården som skrivs ut till kommunal vård och omsorg eller med palliativ vård

Med screening avses provtagning av symtomfria patienter. De provtas i samband med att de skrivs ut till särskilda boenden, korttidsboenden eller till ordinärt boende med hemtjänstinsatser/hemsjukvård/palliativ vård efter inneliggande slutenvård. I första hand används PCR-provtagning. Även ett antigentest godkännes vid prov 1 men prov 2 som tas 3-5 dagar senare på boendet eller i hemmet behöver vara PCR-prov.

Efterfråga om patienten har haft symtom (även lindriga) som kan tyda på covid-infektion de senaste veckorna. PCR kan vara positiv i många veckor efter genomgången infektion, trots att smittfrihet föreligger, se dokument *Kriterier för smittfrihets-bedömning.*

Screeningprovtagning gäller inte patienter som haft covid-19 infektion, bekräftad med provtagning de senaste 3 månaderna, och som skrivs ut till särskilda boenden, korttidsboenden eller ordinärt boende med hemtjänst/hemsjukvård/palliativ vård.

Patienter som har vårdats kortare tid än 1 dygn eller endast har trygghetslarm behöver inte screeningprovtas.

Vid frågor kontakta smittskyddsenheten eller infektionsjour.

Personer på boenden
Patient som skrivs ut till boende (ex SÄBO eller korttidsboende) behöver provtas så att negativt provsvar finns till hands innan patienten skrivs ut. Provet tas så nära utskrivning som möjligt, men tidigast 2 dagar innan utskrivning. Patienten behöver inte isoleringsvårdas i avvaktan på provsvar.

Patienter med positivt svar vårdas om möjligt i slutenvården tills smittfrihet föreligger. Utskrivning till kommunen kan ske om korttidsplats för covidpositiva patienter finns tillgänglig. I undantagsfall kan covidpositiva patienter skrivas ut till boende i samråd med mottagande verksamhet. Vid behov kontakta gärna Smittskydd & Vårdhygien för råd.

Personer med hemtjänst/hemsjukvård
Patient med hemtjänst/hemsjukvård som skrivs hem till ordinärt boende behöver provtas så att provsvar finns till hands innan patienten skrivs ut. Provet tas så nära utskrivning som möjligt men tidigast 2 dagar innan utskrivning.

Vid positivt provsvar ska kommunen kontaktas. Dagtid enligt den rutin som finns för utskrivningsprocessen till kommuner. Kvällar från 16.00 och helger kontaktas jourhavande sjuksköterska i kommunen.

För telefonnummer, se ”Telefonnummer jourtid till alla kommuners kontaktpersoner för info om provsvar covid-19 tilll personer med hemtjänst” via länken http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000042 (gäller endast slutenvården).

Meddelande angående provsvar (oavsett om positivt eller negativt) ska finnas i SIP-modulen under ”medicinsk och omvårdnadsbedömning” innan hemgång. Kommunens svarsmottagare skall informera hemtjänsten.

Personer med negativt provsvar provtas igen, 3-5 dagar efter hemkomst. Primärvården ansvarar för den provtagningen och bevakar detta i SIP-modulen.

Personer med palliativ vård i hemmet
Patient som skrivs hem och har palliativ vård behöver provtas så att provsvar finns till hands innan patienten skrivs ut. Provet tas så nära utskrivning som möjligt men tidigast 2 dagar innan utskrivning.

Vid positivt provsvar ska ansvarig läkare i respektive palliativt team kontaktas. Palliativ läkare nås via växeln. Ring via aktuellt team dagtid och palliativ läkare i beredskap jourtid.

Personer med negativt provsvar provtas igen, 3-5 dagar efter hemkomst. Ansvarig läkare i respektive palliativt team ordinerar och bevakar provsvaret.