

Godkänt  
2021-08-04Giltigt t.o.m  
2024-08-04Versionsnummer  
8.0

Diarienummer

## Screening för covid-19 av patienter i slutenvården som skrivs ut till kommunal vård och omsorg eller med palliativ vård

---

Med screening avses provtagning av symtomfria patienter. De provtas i samband med att de skrivs ut till särskilda boenden, korttidsboenden eller till ordinärt boende med hemtjänstinsatser/hemsjukvård/palliativ vård efter inläggande i slutenvård. I första hand används PCR-provtagning. Även ett antigentest godkänns vid prov 1 men prov 2 som tas 3-5 dagar senare på boendet eller i hemmet ska vara PCR-prov.

Efterfråga om patienten har haft symtom (även lindriga) som kan tyda på covid-infektion de senaste veckorna. PCR kan vara positiv i många veckor efter genomgången infektion, trots att smittfrihet föreligger, se dokument [Kriterier för smittfrihets-bedömning](#).

Screeningprovtagning gäller inte patienter som haft covid-19 infektion, bekräftad med provtagning, det senaste halvåret och som skrivs ut till särskilda boenden, korttidsboenden eller ordinärt boende med hemtjänst/hemsjukvård/palliativ vård.

Patienter som har vårdats kortare tid än 1 dygn eller endast har trygghetslarm behöver inte screeningprovatas.

Vid frågor kontakta smittskyddsenheten eller infektionsjour.

### Personer på boenden

Patient som skrivs ut till boende (ex SÄBO eller korttidsboende) behöver provtas så att negativt provsvar finns till hands innan patienten skrivs ut. Provet tas så nära utskrivning som möjligt, men tidigast 2 dagar innan utskrivning.

Patienten behöver inte isoleringsvårdas i avvaktan på provsvar. Patienter med positivt svar kan skrivas ut till kommunens korttidsplatser för covidpatienter eller vårdas på covidavdelning tills smittfrihet.

### Personer med hemtjänst/hemsjukvård

Patient med hemtjänst/hemsjukvård som skrivs hem till ordinärt boende behöver provtas så att provsvar finns till hands innan patienten skrivs ut.

Provet tas så nära utskrivning som möjligt men tidigast 2 dagar innan utskrivning.

Vid positivt provsvar ska kommunen kontaktas. Dagtid enligt den rutin som finns för utskrivningsprocessen till kommuner. Kvällar från 16.00 och helger kontaktas jourhavande sjuksköterska i kommunen.

För telefonnummer, se "Telefonnummer jourtid till alla kommuners kontaktpersoner för info om provsvar covid-19 till personer med hemtjänst" via länken <http://ar.ltdalarna.se/arbetsrum/AR000042> (gäller endast slutenvården).

Meddelande angående provsvar (oavsett om positivt eller negativt) ska finnas i SIP-modulen under "medicinsk och omvårdnadsbedömning" innan hemgång. Kommunens svarsmottagare skall informera hemtjänsten.

Personer med negativt provsvar provtas igen, 3-5 dagar efter hemkomst. Primärvården ansvarar för den provtagningen och bevakar detta i SIP-modulen.

Personen uppmanas att hålla distans till anhöriga och andra samhällskontakter tills provsvar kommit.

### **Personer med palliativ vård i hemmet**

Patient som skrivs hem och har palliativ vård behöver provtas så att provsvar finns till hands innan patienten skrivs ut. Provet tas så nära utskrivning som möjligt men tidigast 2 dagar innan utskrivning.

Vid positivt provsvar ska ansvarig läkare i respektive palliativ team kontaktas. Palliativ läkare nås via växeln. Ring via aktuellt team dagtid och palliativ läkare i beredskap jourtid.

Personer med negativt provsvar provtas igen, 3-5 dagar efter hemkomst. Ansvarig läkare i respektive palliativ team ordinerar och bevakar provsvaret.

Personen uppmanas att hålla distans till anhöriga och andra samhällskontakter tills provsvar kommit.

---