

Godkänt
2019-03-28Giltigt t.o.m
2022-03-28Versionsnummer
1.0

Diarienummer

TBE-vaccination - nya rekommendationer 2018

Framtagna i samråd med smittskyddsläkare, infektionsläkare och Folkhälsomyndigheten.

Nyhet: sänkt åldersgräns för en extra vaccindos från 60 till 50 års ålder.

Barn och vuxna under 50 år

Grundvaccination består av tre doser: månad 0, 1 och månad 6-12.

Dos 2 ges en månad efter dos 1. Vaccinationsskydd utvecklas ca två veckor efter dos 2.

Dos 3 ges fem-tolv månader efter dos 2, men framför allt i god tid före nästa fästingsäsong.

Personer över 50 års ålder eller som, oavsett ålder, har medicinering som påverkar immunförsvaret

Grundvaccination består av fyra doser: månad 0, 1, 2-3 och månad 6-12.

Den extra dosen ges alltså en-två månader efter dos 2. Det kortare intervallet kan användas vid hög risk för TBE. Dos 4 ges inför nästa fästingsäsong.

Om man inte fått en extra dos det första året kan man lägga till den dosen minst en-två månader efter dos 3 eller 4.

Påfyllnadsdoser=boosterdos (oavsett ålder)

Den första påfyllnadsdosen ges efter tre år. Därefter ges påfyllnadsdos vart femte år.

Påfyllnadsdoserna bör ges innan fästingsäsongen det aktuella året.

Avvikelse från rekommenderat vaccinationsschema

Friska yngre personer behöver inte börja om utan kan fortsätta med schemat oavsett intervall till föregående dos/-er.

Hos personer över 50 år eller immunosupprimerade måste individuell bedömning göras. Om det har gått mer än ett år sedan den första dosen, bör man vara mer liberal med att börja om. Detta med tanke på ökad risk för svår TBE-sjukdom samt förmodat sämre immunologiskt svar på vaccinet.

Snabbvaccination är indicerat vid mycket hög risk för TBE och/eller kort tid för vaccination

Följande schema ger bäst skydd på sikt: **dag 0, 7 och 21**. En uppföljande dos ges som vanligt efter fem-tolv månader inför nästa säsong.