

## Några kommentarer om tolkning Medravediagram Inf31

- Procenttalet blir ett bättre mått ju fler patienter ni haft. Om ni haft väldigt få patienter behöver ni i större utsträckning titta på varje enskild patient.
- Diagnossättningen påverkar till stor del utfallet i diagrammet.
- Tyvärr visas kanske inte bara patienter med akut cystit i diagrammet. (Troligtvis därför så högt målvärde satt som <20%.) Dessa diagnoser ingår:

### Diagnoser medtagna i Inf31 Medräve

Område	Lista	Kod	Beskrivning	Klassifikation
Infektioner	Akut Cystit Lista 1	N30-P	Cystit	KSH97P
Infektioner	Akut Cystit Lista 1	N300	Akut cystit	ICD10
Infektioner	Akut Cystit Lista 1	N308	Annan specificerad cystit	ICD10
Infektioner	Akut Cystit Lista 1	N309	Cystit, ospecificerad	ICD10
Infektioner	Akut Cystit Lista 1	O231	Cystit under graviditeten	ICD10
Infektioner	Akut Cystit Lista 1	O862	Urinvägsinfektion efter förlossning	ICD10
Infektioner	Akut Cystit Lista 1	N390	Urinvägsinfektion utan angiven lokalisation	ICD10

I "Urinvägsinfektion utan angiven lokalisation" kan det ingå febril uvi, som ofta ska behandlas med kinolon. Vilken diagnos sätter man i telefonen om man inte vet om det är en cystit eller ej? Diagnossättningen på er enhet påverkar således procentsiffran.

I strama-appen finns det nu förslag på diagnoser att använda vid resp infektion i öppenvård. Diagrammen blir mer rättvisande om ni använder de koder som är föreslagna. När det gäller cystit är det N300 Akut cystit eller O231 Cystit under graviditeten. (Finns även motsvarande graf för kvinnor.) Tyvärr dålig diagnos för febril uvi i ICD-10. Det som föreslås i strama-appen är N109 Akut tubulo-interstitiell nefrit. Diskutera hur ni diagnostiserar på er enhet.