

	VÅRDRUTIN		1 (3)
	HPV-vaccin – rutin för Region Dalarna		
Ägare: Primärvården Dalarna- Gäller för: Primärvården Region Dalarna Framtaget av (förf.)	Godkänt 2024-11-22	Versionsnummer 8.0	
	Giltigt t.o.m 2027-11-22	Diarienummer RD19/04589	
Godkänt av:			

HPV-vaccin - rutin för Region Dalarna

Vem vaccineras och var?

- Vaccinering mot humant papillomvirus (HPV) ingår i det allmänna barnvaccinationsprogrammet och erbjuds via Elevhälsan i årskurs 5 och till alla flickor sedan 2012 och till pojkar födda 2009 eller senare sedan 2020.
- Ovaccinerade flickor samt pojkar födda 2009 eller senare ska upp till 18 års ålder erbjudas grundvaccinering. Denna vaccinering kan ske via elevhälsovård, vårdcentral eller ungdomsmottagning.
- Kvinnor 18-26 år kan uppmuntras att låta vaccinera sig via en vårdcentral (eller via ungdomsmottagning där det är möjligt).

Personer som inte ingår i grupperna ovan kan mot egen betalning erbjudas vaccination via en vårdcentral eller hänvisas till privat vaccinationsmottagning.

En samtyckesblankett ska fyllas i och tas med vid vaccinering av personer under 18 år. Blanketten ska vara underskriven av vårdnadshavare: [Samtyckesblankett för HPV-vaccin \(från SKR, olika språk\)](#)

Avgifter

Dessa grupper ska erbjudas kostnadsfri vaccination med upphandlat vaccin (se nedan)

- Ovaccinerade flickor upp till 18 års ålder samt pojkar födda 2009 eller senare upp till 18 års ålder.
- Kvinnor som inte har fyllt 27 år.

Övriga:

- Kvinnor 27 år eller äldre samt pojkar/män födda innan 2009: HPV-vaccin förskrivs av läkare på recept. Injektionsavgift enligt [Vårdavgiftshandboken](#).

Ordination/recept och rekvirering av upphandlat preparat

Det är viktigt att **Gardasil9** rekquireras direkt från distributören för att få avtalat pris och ej via apotek eller Raindance. Detta görs enligt [särskild rutin](#) (klicka på "Lista över upphandlade vacciner").

Observera att vaccin som beställts via Region Dalarnas avtal inte får användas för vaccinationer där patienten själv betalar för vaccinationen.

Ordination av vaccin

Sjuksköterskor med erforderlig kompetens har ordinationsrätt till flickor upp till 18 års ålder samt pojkar födda 2009 eller senare upp till 18 års ålder.

Som erforderlig kompetens räknas sjuksköterska med vidareutbildning till distriktssköterska eller specialistutbildning mot barn och ungdomar, eller likvärdig utbildning (verksamhetschef avgör).

Barnmorskeexamen innebär inte erforderlig kompetens att ordinera. Sjuksköterska kan dock alltid administrera läkemedlet.

Upprättat av Hogmark Sara /Kvinnosjukvård Dalarna /Falun

Godkänt av Hogmark Sara /Kvinnosjukvård Dalarna /Falun

För verksamhet LD; Division Primärvård; Hälso- och sjukvård Dalarna

Dokumentsamling Vårdprogram primärvård

Vaccination utanför barnvaccinationsprogrammet (av kvinnor över 18 år, samt av pojkar födda före 2009, kräver däremot läkarordination. Det krävs även ordination av läkare om vaccindoserna ges med andra minimum- och maximumintervall än vad som står i Folkhälsomyndighetens föreskrift.

Läkare på specialistklinik som ordinerar vaccin för patient, som sen hänvisas till vårdcentral för vaccination, ordinerar vaccinet i läkemedelsmodulen.

Individer 9-14 år kan vaccineras med Gardasil9 enligt ett tvådosschema (0, 6-12 mån).

Individer som är 15 år eller äldre vaccineras med Gardasil9 enligt 3-dosschema (0, 2, 6 mån). I övrigt, se [FASS](#)

Dokumentation/registrering

Den som iordningställer och administrerar vaccinet skall dokumentera vem som ordinerat samt vaccinets batchnummer eller något annat identifikationsnummer i patientjournalen." SOSFS 2006:24

Vaccinationen ska dokumenteras:

- i journalens vaccinationsmodul
- Vaccination som ges inom barnvaccinationsprogrammet ska rapporteras i [Vaccinationsregistret](#). Rapporteringen sker automatiskt då vaccinationen registreras i TakeCare.

Information om vaccinet

Gardasil9 skyddar mot infektion av nio typer av HPV, vilket beräknas ge ca 90 % skydd mot livmoderhalscancer samt förebygger kondylom. Det förväntas även ge ett skydd mot cancer i vagina, vulva, penis, svalget och ändtarmsöppning.

Det gamla vaccinet, Gardasil, skyddar mot fyra typer av HPV, vilket förebygger kondylom samt anses ge ca 70 % skydd mot livmoderhalscancer.

Den som tidigare har vaccinerats med Gardasil kan vaccineras med Gardasil 9 som kompletterande dos för att få ett mer effektivt skydd.

Ytterligare information för hälso- och sjukvårdspersonal

[Vaccin mot Humant papillomvirus \(HPV\)](#) (Folkhälsomyndigheten)

[Vaccination av barn och ungdomar – vägledning för vaccination enligt föreskrifter och rekommendationer](#) (Folkhälsomyndigheten 2016 – innehåller allmänna principer för vaccinering, ordinationsrätt, journalföring och registrering)

[HPV-vacciner: EMA bekräftar att beläggen inte ger stöd för att de orsakar CRPS eller POTS](#) (EMA, European medicines agency 2016)

Information till patienter

[1177 - Vaccination mot HPV](#)

[Bra att veta om HPV](#) (Faktablad till föräldrar, på flera olika språk, Folkhälsomyndigheten)
