

Handläggning för screening av personal inom primärvården Region Dalarna med antigenestning för covid-19

Känsligheten för antigenesterna är lägre än för PCR-testerna, vilket betyder att risken för ett falskt negativt resultat (att den sjuka ska ha covid-19 trots negativt resultat) ökar.

Testerna kommer att användas för personal som annars inte skulle ha testats alls och bedöms därför ha tillräckligt hög känslighet.

Syftet med testningen är att minska risken för smittspridning.

Beställning av testerna

Görs från beredskapslagret i Falun.

Indikation

Personal på arbetsplatsen som inte har symptom på covid-19.


Följande personer är undantagna från screening:

- De som har haft covid-19 bekräftat med PCR-prov de senaste sex månaderna.
- Fullvaccinerad personal, dvs ≥ 2 veckor efter den andra dosen covidvaccin.

Registrering av resultatet i Take care

Analysen heter SARS-Cov-2 Personal.

Både positiva och negativa mätvärden registreras.



När ska man även ta PCR-test?

Vid positivt resultat ska PCR-prov tas för bekräftelse.

Skälet är att även falskt positiva provsvar kan förekomma vid antigen testning.

Även vid svagt positivt eller osäkert resultat ska PCR-prov tas. I dessa båda fall ska resultatet tills vidare betraktas som positivt.

När ska enbart PCR-test tas?

- Vid symptom på covid-19 ska personal genast gå hem och boka tid för PCR-test.

Handläggning av personal med positivt antigen test

PCR-prov enligt ovan.

- Förhållningsregler (smittskyddsblad): muntliga och skriftliga förhållningsregler ges.

Länk till smittskyddsblad : "Patientinformation covid-19":

<https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/>

Smittskyddsanmälan

OBS! Smittskyddsanmälan behöver inte göras förrän man har svar på PCR-test.

- Om det är positivt, smittskyddsanmäl PCR-testet.
- Om det är negativt och patienten inte har utvecklat symptom behövs ingen smittskyddsanmälan. Om personen under tiden har fått symptom: ta nytt PCR-test.

Smittspårning

Smittspårning på arbetsplatsen utförs av smittspårningsenheten. Kontakta Smittskydds-enheten snarast så ombesörjer de kontakt med smittspårningsenheten. Telefonnummer 023-490785.

Be den positiva att informera de hushållskontakter och andra nära kontakter denna umgåtts nära med (tumregel: inomhus, inom 2 m avstånd, mer än 15 min) inom de senaste 2 veckorna: om att stanna hemma vid symtom och provta sig.

Länk till den informationen som patienten kan vidarebefordra till närläkarna:

[Till dig som kan ha utsatts för coronasmitta](#)

Hushållskontakter

Se länk nedan vad som gäller för hushållskontakter

<https://slf.se/smittskyddslakarforeningen/smittskyddsblad/>

Testinstruktioner

Följ dessa instruktioner och inte instruktionerna som följer med testen.

OBS! Förutom prov i nasopharynx ska svalgprov alltid tas.

Instruktion för Abbotts antigenest

[Coronavirus SARS-CoV-2 antigenest \(Abbott\) – Region Dalarna](#)
