



INSTRUKTIONER VID STERILISERING

Allmänt

Vid en steriliseringsoperation klipps sädesledarna av och förbindelsen mellan spermieförrådet i bitestikeln och urinröret bryts. För att kontrollera resultatet av steriliseringsoperationen lämnar mannen minst tre spermaprover. När resultatet av analyserna är klara skickas svaren till den opererande läkaren.

Provtagning

Det första provet kan lämnas så snart som det har slutat ömma efter operationen.

Att samla provet är inte alltid så lätt. Använd plastburk eller speciell plastkondom. Luta burken så går det lättare. Det är väsentligt att hela spermaprovet samlas upp.

Mannen lämnar minst tre spermaprover. Hittar man spermier i något av dessa prover får mannen lämna ytterligare ett eller flera spermaprover tills att man fått tre stycken spermiefria prover. Det är inte ovanligt att proverna innehåller ett antal orörliga spermier. För att undvika detta bör mannen före det första och mellan varje spermaprov ha ett flertal (ca 8-10) egna sädesuttömningar.

Inlämning

Inlämning sker måndag – torsdag kl 7.30 – 12.00.

Verksamheten har semesteruppehåll under juli.

Avdelningen för Klinisk Patologi och Cytologi är belägen vid Stora Entrén på Falu lasarett. Ta direkt till höger efter informationsdisken och följ sedan skyltarna.

Eventuella förfrågningar

Ring 023 – 49 27 97