

Instruktioner för behörighetsutbildningar för ordination av vaccin mot covid-19, influensa och pneumokocker 2026

Viktig inledande information

Distriktssköterskor och specialistsjuksköterskor inom hälso-/sjukvård för barn och ungdomar har rätt att ordinera vaccin mot influensa, covid-19 och pneumokocker till rekommenderade grupper. Övriga sjuksköterskor behöver gå en likvärdig utbildning för att få ordinationsrätt. Alla sjuksköterskor har rätt att administrera (ge) vaccin.

Vi erbjuder sjuksköterskor att ta del av Region Värmlands tre utbildningar för externa användare: *Behörighetsutbildning för ordination Covid-19*, *Behörighetsutbildning för ordination influensa* och *Behörighetsutbildning för ordination pneumokocker*. **Observera att några rutiner skiljer sig något mellan regionerna. Läs rutinerna på [Influensa och covid-vaccination \(regiondalarna.se/plus\)](https://regiondalarna.se/plus) och se hänvisningar nedan.**

Man kan genomföra utbildningen och kunskapstesterna flera gånger. Efter godkänt kunskapstest, ladda ner certifikatet om genomförd e-kurs och lämna till din verksamhetschef.

Det är varje verksamhetschefs ansvar att formellt bedöma om utbildningen är godkänd och lever upp till kraven. Behörighet för ordination ges genom att verksamhetschefen undertecknar behörighetsintyget som finns på [Influensa och covid-vaccination \(regiondalarna.se/plus\)](https://regiondalarna.se/plus)

Skillnader i rutiner mellan regionerna

- **Influensa:** I Dalarna används Fluarix (inte Influvac). Se bifogad tabell nedan. Man behöver registrera ett konto på Värmlands sida för att genomgå den utbildningen.
- **Covid:** Man når inte MittVaccin via länken i utbildningen. Följ länken nedan för MittVaccin.
- **Överkänslighet:** Vi använder Region Dalarnas [Handläggning vid uppgiven överkänslighet i samband med vaccination mot Covid-19, influensa och pneumokocker](#)
- **Covid:** Man har ingen access till MittVaccin via länken i utbildningen.
- Instruktion för ordination och administration i MittVaccin: [Ordinera vaccination mot covid och influensa och pneumokocker](#) samt [Administrera vaccin från ordinerad vaccinationsplan](#).
- **Vaccination vid blodförtunnande läkemedel:** Vi använder Region Dalarnas [Vaccinering vid Waran OAK Region Dalarna](#) OBS! Gäller trots att den inte är uppdaterad. Tillämpas även för influensa och pneumokockvaccination.

Hantering av Fluarix och Fluad

Fluarix: Normalvaccin mot influensa som används till de flesta som rekommenderas influensavaccin.

Fluad: Förstärkt vaccin mot influensa som används på särskilda boenden för äldre (SÄBO). Fluad är godkänt för vaccination från och med 50 års ålder.

	Fluarix	Fluad
Vaccintyp	Inaktiverat virus. 15 µg av vardera tre virusstammar.	Inaktiverat virus och adjuvans. 15 µg av vardera tre virusstammar.
Dos	0.5 ml förfylld spruta	0.5 ml förfylld spruta
Administreringssätt	Intramuskulärt	Intramuskulärt
Omskakas före användning	Skakas väl så att en färglös och halvgenomskinlig vätska erhålls.	Ja varsamt. Efter skakning är vaccinet vanligtvis en mjölkvit vätska.
Förvaring	Förvaras i kylskåp: 2°C-8°C. Ljuskänsligt. Förvaras i yttreförpackningen. Får inte frysa.s	Förvaras i kylskåp: 2°C-8°C Ljuskänsligt. Förvaras i yttreförpackningen. Får inte frysas.
Hållbarhet i rumstemperatur	72 timmar* vid högst 25 °C	48 timmar* vid högst 25 °C

*Om förpackningen ställs tillbaka i kylskåpet ska den märkas upp och användas direkt vid nästa vaccinationstillfälle.

Observera att det är tiden från att man tar ut sprutan i rumstemperatur tills den används som räknas.

Instruktion:

- Gå till [Utbildningar - Region Värmland](#)
- Välj Behörighetsutbildning för ordination Covid-19/Influensa/pneumokocker
- Klicka på länken under *Du som inte är anställd i regionen (Utbildningsplattformen för externa användare)*