

Åtgärder vid tarminfektioner - lathund

Agens	Inkubationsstid	Huvudsaklig smittväg	Antibiotika ^A	Bärarskap	Återgång till arbete/skola ^B	Särskilda åtgärder riskyrke ^C	Särskilda åtgärder barn i förskola	Kontakt med Smittskydd ^D
Calicivirus	12-48 timmar	Fekal-Oral smitta. Livsmedel, person-person	Nej	2-3 dygn	24h efter sista kräkning/diarré	Återgå 48h efter sista kräkning/diarré. Vårdpersonal: se lokala riktlinjer	Återgå 48h efter sista kräkning/diarré.	-
Campylobacter	2-5 dygn (1-10 dygn)	Fekal-oral smitta. Livsmedel, vatten, djur	Nej	Ca 3 veckor	Vid symtomfrihet	-	-	Smittskydds-anmäl
Cryptosporidium	2-7 dygn (2-14 dygn)	Fekal-oral smitta. Vatten, bassäng-vatten, person-person, djur	Nej	Ca 3 veckor	Vid symtomfrihet	-	-	Smittskydds-anmäl
EHEC	2-4 dygn (1-8 dygn)	Fekal-Oral smitta. Livsmedel, djur, person-person	Nej	Ca 3 veckor. Längre hos barn	Vid symtomfrihet	stx2/stx1+HUS: Kontrollprov. Återgå om negativt.	stx2/stx1+HUS: Kontrollprov. Återgå om negativt.	Kontakta Smittskydds-anmäl.
Entamoeba histolytica (Amöba-infektion)	2-4 veckor (dagar-månader)	Fekal-Oral smitta. Livsmedel, vatten, person-person	Ja	Efter behandling, annars månader	Vid symtomfrihet. Kontrollprov 1v efter avslutad behandling	-	-	Smittskydds-anmäl
Giardia	Vanligen 1-2 veckor	Fekal-Oral smitta. Livsmedel, vatten, person-person	Ja	Upphör efter behandling, annars månader	Vid symtomfrihet efter behandling.	-	Kontrollprov 3 veckor efter avslutad behandling.	Smittskydds-anmäl
Hepatit A	2-6 veckor (medeltal 4 v)	Fekal-Oral smitta. Livsmedel, vatten, person-person	Nej	1 v efter ikterusdebut.	-	Tidigast en vecka efter ikterusdebut/sjunkande transaminaser, om då symtomfri.	Tidigast en vecka efter ikterusdebut/sjunkande transaminaser, om då symtomfri.	Kontakta Snarast^E Smittskydds-anmäl
Rotavirus	1-3 dygn	Person-person	Nej	6-8 dygn	24h efter sista kräkning/diarré	Återgå 48h efter sista kräkning/diarré	Återgå 48h efter sista kräkning/diarré	-
Salmonella	12-48h (6-72h eller längre)	Fekal-Oral smitta. Livsmedel, djur, person-person	Nej	Vuxna: ca 4veckor - 3 månader. Barn: månader-år	Vid symtomfrihet	Endast vid hantering av oförpackade livsmedel: Kontrollprov 1-2 v efter symtomfrihet. Återgå om negativt .	-	Kontakta. Om förskolebarn. Smittskydds-anmäl.
Shigella	2-3 dygn (1-7 dygn)	Fekal-Oral smitta. Livsmedel, person-person	Ja	Upphör efter behandling	Vid symtomfrihet	Kontrollprov 1 v efter avslutad antibiotika. Återgå om negativt.	Kontrollprov 1 v efter avslutad antibiotika. Återgå om negativt.	Kontakta. Smittskydds-anmäl.
Salmonella Tyfi & S. Paratyfi	10-14 dygn (kan vara kortare)	Fekal-Oral smitta. Livsmedel, person-person	Ja	5-6 veckor. Kroniskt bärarskap i 2-5% av fallen	Vid symtomfrihet	Endast vid hantering av oförpackade livsmedel: Kontrollprov 1 v efter avslutad antibiotika. Återgå om negativ x3.	Kontrollprov 1 v efter avslutad antibiotika. Återgå om negativ x3.	Kontakta. Smittskydds-anmäl.
Yersinia	2-7 dygn (1-10 dygn)	Fekal-Oral smitta. Livsmedel, djur	Nej	Cirka 3 veckor	Vid symtomfrihet	-	-	Smittskydds-anmäl

A)Gäller för de flesta fall med okomplicerad sjukdom. Vid allvarigare symtom ska antibiotika alltid övervägas.

B) Förutsatt att man kan tillgodogöra sig hygienråd

C) Riskyrke: Hantering av oförpackade livsmedel eller yrkesmässig vård av spädbarn eller patienter med kraftigt nedsatt immunförsvar. I första hand omplacering. Personer som arbetar med oförpackade livsmedel ska enligt livsmedelslagstiftning alltid meddela sin arbetsledare vid tarminfektioner.

D)Kontakta alltid smittskyddet vid misstänkt utbrott.

E) Dagtid kontaktas omedelbart smittskyddsenheten. Helger kontaktas infektionsjour.

Upprättat av Backlund Gustav /Laboriemedicin Dalarna /Falun

Godkänt av Rücker Fredrik /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun

För verksamhet Hälso- och sjukvård Dalarna

Dokumentsamling