

Godkänt
2022-12-02Giltigt t.o.m
2025-12-02Versionsnummer
4.0

Diarienummer

Hepatit B-vaccination av personal

Man skiljer på pre- respektive postexpositionsprofylax. Preexpositionsprofylax innebär vaccination för särskilt riskutsatt personal i förebyggande syfte. Postexpositionsprofylax innebär att vaccination ges efter en känd eller förmodad exposition för hepatit B-virus

Preexpositionsprofylax

Anställda som i sitt arbete riskerar att utsättas för blodsmitta ska efter riskbedömning erbjudas vaccination mot hepatit B.

Det rör sig exempelvis om personal inom:

- hälso- och sjukvården
- tandvården
- laboratorier som ofta kommer i kontakt med blod som kan vara smittat med hepatit B
- omsorgsverksamhet där det finns en risk för att hepatit B-smitta förekommer
- kriminalvård och polis med särskilt hög risk för att komma i kontakt med blod från smittförande personer

I enlighet med Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2018:4) om smittrisker är det arbetsgivarens ansvar att bedöma smittriskerna på arbetsplatsen och att vid behov erbjuda vaccination. Vaccinationen inklusive immunitetskontroll ska bekostas av arbetsgivaren och vara kostnadsfri för den anställde.

Vaccinationens genomförande

Hepatit B-vaccin (i nuläget Engerix- B 20 mikrogram/1 ml till vuxen) ges i tre doser vid tidpunkterna 0, 1 och 6 månader. Vaccinet ges intramuskulärt i deltoideus.

Personer med kronisk njursvikt svarar sämre på hepatit B-vaccination och därför rekommenderas dubbel dos och 4 immuniseringar (vid 0, 1, 2 och 6 månader).

För de som sedan tidigare är ofullständigt vaccinerade (färre än 3 doser) så fullföljs vaccinationen enligt ovan. Alla vaccinationsdoser räknas, oavsett tid mellan doser.

Immunitetskontroll

Efter sista vaccindosen ska anti-HBs kontrolleras för att avgöra om immunitet föreligger. Kontrollen ska ske tidigast 1 månad efter sista dosen och helst inom 1-2 månader.

Upprättat av Ernlund Helena /Infektionssjukvård Falun /Falun

Godkänt av Rucker Fredrik /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun

För verksamhet LD

Dokumentsamling Riktlinjer Smittskydd/vårdhygien

Beställning av blodprovet görs i TakeCare - Klinisk Mikrobiologi – Vaccination hepatit – Hepatit vaccinationskontroll-P/S-Anti-HBs (kvantitativ).

≥ 10 IU/L medför skyddande antikropps nivå och ytterligare doser behövs ej.

< 10 IU/L: ytterligare två vaccindoser med 1 månads mellanrum ges. Därefter görs en ny immunitetskontroll 1 månad efter sista dosen.

Om nivåerna då fortfarande är <10 IU/L betraktas den vaccinerade som "non-responder" med risk för ofullständigt skydd mot hepatit B-infektion och ska vid exposition för hepatit B behandlas som ovaccinerad.

Personal som sedan tidigare är fullvaccinerad mot hepatit men ej gjort immunitetskontroll rekommenderas att göra det.

Vid nivåer <10 IU/L rekommenderas:

Om mer än ett år gått mellan sista dosen och provtagning ges ytterligare en dos.

Om mindre än ett år gått ges två doser med en månads mellanrum.

En ny immunitetskontroll görs därefter 1 månad efter sista dosen.

Påfyllnadsdos

Person som svarat med anti-HBs >10 IU/L efter vaccination betraktas ha livslång immunitet, även om anti-HBs-nivåerna kan sjunka med tiden. Ingen påfyllnadsdos behöver ges och anti-HBs behöver ej kontrolleras om.

Hos personer med kronisk njursvikt eller immunsuppression kan dock påfyllnadsdos ibland ges.

Postexpositionsprofylax

Ges till de som är ofullständigt vaccinerade (d v s de som inte har vaccinerats med 3 doser och därefter har visat sig ha immunitet (≥ 10 IU/L) vid stick- och skärskada eller annan händelse med risk för blodsmitta. Se [Stickskada eller annan händelse med risk för blodsmitta](#) för instruktioner.

Uppföljande vaccination efter postexpositionsprofylax

Tidigare ovaccinerad eller osäkert om vaccinerad med anti-HBs <10 IU/L.

Slutför vaccinationen enligt snabbvaccinationsschema (0, 7 och 21 dagar).

Anti-HBs kontrolleras en månad efter 3:e dosen.

- Om anti-HBs då är <10 IU/L ges en fjärde dos och anti-HBs kontrolleras efter ytterligare 1 månad.

Om anti-HBs åter är <10 IU/L ges också en femte dos.

- Vid anti-HBs ≥ 10 IU/L efter snabbvaccinationsschema ges ytterligare en dos c:a ett år efter första dosen för långtidsskydd.

Tidigare ofullständigt vaccinerad (färre än 3 doser).

Fullfölj vaccinationen. Alla vaccinationsdoser (även den som givits vid händelsen) räknas, oavsett tid mellan doser. Kontrollera anti-HBs en månad efter tredje dosen.

Tidigare vaccinerad med anti-HBs <10 IU/L.

En dos ges i samband med sticktillbudet. Anti-HBs kontrolleras efter 1 månad.

Tidigare vaccinerad med anti-HBs ≥ 10 IU/L.

Behöver ingen dos vid tillbudet.

Referenser

Arbetsmiljöverket 2018 - Arbetsmiljöverkets föreskrifter och allmänna råd om smittrisker 2018:4 210902

Folkhälsomyndigheten 2019 - Rekommendationer om vaccination mot hepatit B

Referensgruppen för Antiviral Terapi 2019 - Behandling av hepatit B-virusinfektion hos vuxna och barn – Rekommendation 2019
