

Vinterns virus

REGION DALARNA


Annica Blomkvist

Michaela Skytt

Hygiensjuksköterskor
Vårdhygien

Magsjuka och luftvägsvirus –hur skyddar vi personal och vårdtagare?

- Influensa
- Covid -19
- RS
- Calici



AI genererad bild

Det finns effektiva sätt att minska spridning av både luftvägsvirus och vinterkräksjuka!

Det underlättar om man känner till hur dessa smittor sprids och hur man bryter smittvägar.

Agera utifrån symtom och vänta inte på diagnos innan åtgärder sätts in.

Åtgärdsplan (hur gör vi när patient eller personal insjuknar) och kända rutiner för all personal

Vården ska organiseras och planeras så att smittspridning och vårdrelaterade infektioner kan förebyggas



AI genererad bild

Vilket ansvar har jag som chef?

- Fördela och planera verksamhetens hygienarbete
- Känna till vårdhygieniska rutiner och riktlinjer
- Säkerställa att dessa är kända och tillgängliga för all personal
- Säkerställa och följa upp att rutiner följs
- Rätt kunskap hos personalen
- Säkerställa att nödvändig utrustning finns

Föreskrifter som betonar detta: AFS 2023:10. SOSFS 2015:10. HSLF-FS 2022:44. SOSFS 2011:9




AI genererad bild

Men efter den här föreläsningen kommer det att se ut så här




AI genererad bild

Smittvägar för luftvägsvirus



Smittvägar för luftvägsvirus



Vad är influensa?


- Luftvägsinfektion orsakat av influensavirus
- Ger allvarligare infektion än förkylningsvirus
- Återkommer varje år
- Har stor förmåga att ofta ändra sig
- Orsakar säsongsbundna epidemier
- Olika typer **A**, **B**, C
- Antiviral behandling/profylax finns
- Vaccinering rekommenderas för vårdpersonal samt riskgrupper



AI genererad bild

Vad är Covid-19

- Orsakas av coronaviruset SARS-CoV-2 (Severe acute respiratory syndrome coronavirus 2)
- Viruset muterar kontinuerligt till nya varianter
- Orsakar lindrig sjukdom hos de allra flesta men kan leda till allvarlig sjukdom och död hos vissa personer
- Äldre personer har större risk att drabbas av svår sjukdom. Covid-19 kan även ge långvariga besvär
- Antiviral behandling finns
- Vaccination är det bästa sättet att skydda individer med störst risk för allvarliga konsekvenser. Olika rekommendationer för olika åldersgrupper/riskgrupper
- Inom vård och omsorg är det fortsatt viktigt att förebygga smittspridning



AI genererad bild

Vad är RS-virus (respiratoriskt syncytialvirus)

- Vanlig orsak till övre luftvägsinfektion
- Sprids mest bland små barn. Vanligaste orsaken till nedre luftvägsinfektion hos barn yngre än ett år. Kan även orsaka svår sjukdom hos äldre och immunnedsatta
- Orsakar akut luftvägsinfektion, med symtom från lindrig förkylning till allvarlig lunginflammation eller bronkiolit (trånga luftvägar av infektionen)
- Förekommer i årliga epidemier under vinterhalvåret. Kan komma vid olika tidpunkter på säsongen och vara olika kraftiga från år till år




AI genererad bild

Patientfall

Kalle bor på Skogsdungens SÄBO. Nu under dagen får Kalle plötsligt hög feber, ont i kroppen och huvudvärk.

1. Vad kan Kalle ha drabbats av?
2. Vad bör du som chef tänka på när det gäller vården av Kalle?



AI genererad bild

Aktuella åtgärder vid luftvägsvirus

REGION DALARNA

RIKTLINJE

Godkänt 2026-01-05 | Versionsnummer 9.0
Giltigt t.o.m 2029-01-05 | Diarienummer

Kommunal vård Dalarna hygienriktlinjer

Innehållsförteckning

Inledning 6
Förord
Vårdhygien
Ansvar

Smitta och smittspridning 7
Smittvägar

Basal hygien 9
Handdesinfektion
Handtvätt
Handskar
Skyddskläder
Stänkskydd

Personlig skyddsutrustning

Klädregler 11
Arbetsdräkt
Händer
Smycken
Hår

Personlig hygien 12

Renhetsgrader 13
Rent
Sterilt
Förvaring av sterila och höggradigt rena produkter
Hemsjukvårdens väska

Desinfektion 16
Spoldesinfektor
Diskdesinfektor
Kokning
Kemisk desinfektion av föremål
Kemisk desinfektion av ytor
Desinfektionsmedel
Desinfektionsrum

Upprättat av Nyman Erica /Central förvaltning Hälso- och sjukvårdsenhet Smittskydd /Falun
Godkänt av Thelander Marie /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun
För verksamhet LD
Dokumentsamling Smittskydd/Vårdhygien

REGION DALARNA

RIKTLINJE

Godkänt 2025-09-11 | Versionsnummer 13.0
Giltigt t.o.m 2028-09-11 | Diarienummer

Översikt över rekommenderade smittskyddsåtgärder mot luftvägsvirus i vård och omsorg

Denna översikt är en regionalt bearbetad och nedkortad version av Folkhälsomyndighetens vägledning Åtgärder mot smittspridning av virusorsakade luftvägsinfektioner inom vård och omsorg
För mer information hänvisas till vägledningen i sin helhet.


Patient med symtom på luftvägsvirusinfektion

Åtgärd	Gäller	Gäller personal	Gäller patient/besökare
Placering av patient	Patienter och omsorgstagare med misstänkt eller bekräftad virusorsakad luftvägsinfektion bör, så långt det är möjligt, inte vistas med andra patienter eller omsorgstagare förrän de bedöms som smittfria		X
Provtagning av patient/omsorgstagare med symtom inom vård och omsorg	PCR-prov tas när behandlande läkare bedömer att diagnos har betydelse för fortsatt patienthandläggning, exempelvis då det kan vara aktuellt att ge antiviral behandling till patient eller exponerade. Prov kan också tas om diagnos kan ha betydelse för fortsatta vårdhygieniska åtgärder, exempelvis om patienter behöver dela rum. Observera att väntan på provsvar aldrig får fördröja eller förhindra att patienten får den vård eller behandling som hans eller hennes tillstånd kräver		X

Upprättat av Thelander Marie /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun
Godkänt av Thelander Marie /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun
För verksamhet Region Dalarna
Dokumentsamling Smittskydd/Vårdhygien

Omhändertagande av vårdtagare med luftvägsinfektion

- Så långt det är möjligt- inte vistas med andra vårdtagare förrän de bedöms som smittfria. Enkelrum med eget hygienutrymme. Stängd dörr
- Basala hygienrutiner
- Använd (endast) skyddshandskar vid kontakt med kroppsvätskor eller slemhinnor
- Engångs plastförkläde utan ärm – i vårdtagarnära vårdsituationer



AI genererad bild

Skyddsutrustning för personal

- Munskydd klass IIR på rummet
- Visir/skyddsglasögon vid risk för stänk (inom 2 meter)
- Andningsskydd rekommenderas (istället för munskydd) i vissa situationer med ökad smittrisk, ex. lång exponeringstid hos kraftigt hostande patient, vid intubation, vid andningsgymnastik

Andningsskydd ska vara av klass FFP2 eller FFP3. Personalen ska vara väl förtrogen med på- och avtagning samt tillpassning av andningsskyddet

Stänkskydd, munskydd och andningsskydd







Aktuella smittskyddsåtgärder

- Personal med nytillkomna symtom på luftvägsinfektion rekommenderas stanna hemma och kontakta sin chef. Kan återgå efter allmän förbättring och feberfrihet sedan minst ett dygn
- Vid lindriga/ospecifika symtom hos personal, risk-nyttabedömning av chef
- Vid utbrott eller utbrottsrisk på en enhet rekommenderas snabbt införande av tillfällig kontinuerlig munskyddsanvändning för personal
- Vid utbrott/utbrottsrisk på en enhet bör personal sträva efter att hålla avstånd till varandra, exempelvis i personalrum och vid möten



Disk/Tvätt/Avfall/Städning

- Disk — Hanteras som vanlig disk
- Tvätt — Hanteras som vanlig tvätt
- Avfall — Hanteras som vanligt avfall
- Städning — Städas som vanligt



Utbrottshantering?

Flera vårdtagare har luftvägssymtom på enheten. Nu har flera i personalgruppen också insjuknat och är hemma från jobbet.


- Hur kan/bör man tänka här?
- Åtgärder?

Personalsituationen är akut! Vad gör jag som chef?




AI genererad bild

Calicivirus/vinterkräksjuka



AI genererad bild

Möjliga smittvägar



AI genererad bild

Bakgrund om calicivirus

- Små virus som kommer tillbaka varje år i ny skepnad.
- Uppträder oftast nov-april, topp jan-mars
- Vistelse inomhus; närkontakt
- Förekommer även sporadiskt sommartid



AI genererad bild

Symtom vid calicivirus

- Inkubationstid: 12-48 timmar
- Symtom: illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Debuterar snabbt. Varaktighet 1-2 dygn
- Smittade personer kan vanligen sprida smitta upp till två dygn efter symtomfrihet, ibland längre
- Sjukdomen är självläkande inom några dygn. Eftersom genomgången infektion bara ger ett kortvarigt skydd kan man drabbas flera gånger under kort tid. Återinsjuknanden är ganska vanliga
- Vanligt att flera blir smittade



AI genererad bild

Patientfall

Kurt är inskriven på korttidsboendet Lyktan. Det är fredag klockan 18 och Kurt kräks efter middagen i korridoren utanför sitt rum.

Vad bör jag som chef ha planerat innan detta händer?


Förslag på hur en verksamhetsnära plan för detta kan se ut?



AI genererad bild


Uppföljning
Utvärdering
Kontakt med MAS
och Vårdhygien
Följsamhet
till basala
hygienrutiner
Handtvätt
Information till
personal
Rutiner vid
magsjuka
Information till
anhöriga?
Vad behöver
enhetschefen ha koll på?
Tvätthantering
Bemanning
Slutstäd
Sköljrum?
Städ
Livsmedel
Virkon?
Möjlighet
att
avgränsa?
Utbildning

Vård vid magsjuka



VÄRDRUTIN

Sida: 1(3)

REGION DALARNA

Godkänt: 2022-09-30
Giltigt t.o.m: 2025-09-30

Ver.nr: 4.0
Dnr:

Virusorsakad gastroenterit

Allmänt	Den vanligaste orsaken till gastroenterit är virusinfektion. Infektion med calicivirus är mycket smittsam, endast ett fåtal viruspartiklar räcker för att orsaka sjukdom. Insjuknade personer utsöndrar stora mängder virus via avföring och kräkning. Smittspridning sker då smittämnet når munnen (fekal-oral smitta) via direkt- eller indirekt kontakt, ofta via händer, förorenade ytor och föremål, livsmedel och handdukar. Häftig kräkning och diarré kan bilda aerosoler som kan innebära risk för droppsmitta, men smittan är i övrigt inte luftburen. Viruset kan överleva veckor i vårdmiljö. Inkubationstid är 12-48 timmar. Sjukdomsförloppet är i allmänhet kortvarigt, de flesta drabbade är återställda inom 12-72 timmar.
Hygienrutiner	Basala hygienrutiner ska tillämpas. Alkohol har inte fullständig effekt på calicivirus. Därför ska händerna tvättas med tvål och vatten, torkas torra och därefter desinfekteras med handdesinfektionsmedel.
Placering av patient	Patient med misstanke om virusgastroenterit (kräkning/diarré) som kräver sjukhusvård ska omedelbart isoleras i eget rum med toalett, helst på infektionsklinik. Inneliggande patient som insjuknar med symtom på gastroen… toalett. Då en patien… isoleras. Ing… senaste sym…
Utbrott	Då två eller …
Provtagning	Avföringspr… för att få en… provtagning…
Kohortvård	Grunden för… personal av… hantera livs… För att koho… verksamhet…
Intagningsstopp	Intagningss… och /eller o…

Upprättat av: Nyman Erica /Cert…
Godkänt av: Thelander Marie /Sj…
För verksamhet: LD
Dokumentsamling: Riktlinjer Smittsky…

Checklista-Vinterkräksjuka

- Isolera patienten/patienterna på vårdrummet, stäng dörren
- Ta avföringsprov enligt ordination
- Informera verksamhetschef, sjukhussamordnaren, vårdpersonal, berörda service avdelningar
- Vid utbrott - skylta avdelningen med information om magsjuka
- Informera Vårdhygien
- Tillämpa basala hygienrutiner med tillägg av handtvätt före handdesinfektion
- Informera patienterna om vikten av god handhygien, hjälp dem som inte klarar sig själva
- Inför om möjligt kohortvård
- Avdela personal som sköter mathanteringen
- Ingen bufféservering (mat, fika, fruktskålar osv) varken till patienter eller personal
- Daglig städning med rengöringsmedel och vatten samt desinfektion av patientnära ytor med Virkon. Punktdesinfektera med Virkon vid spill och stänk
- Meddela Vårdhygien det totala antalet insjuknade, patienter och personal, när utbrottet är avslutat



REGION DALARNA Plus - Region Dalarnas samverkansnewebb

Sök

VÅRD | HJÄLPMEDEL | FÖRSKRIVNING | KULTUR | FÖRETAGSSNÄVALDA | LEVERANTÖRER

Vård

Vård och behandling
- Ambulanssjukvård
- Arbetsterapi
- Asyl- och migranthälsa
- Barnhälsovårdsenheten Dalarna
- Geriatrik
- Gröd- och funktionsmedicin
- Fotterapeuter
- Fysioterapi
- Försäkringsmedicin
- Laboratoriemedicin
- Läkemedel
- Medicinsk teknik
- Nationella taxan - privata fysioterapeuter & liknare
- OCD-mottagning
- Sjukhusbiblioteket i Dalarna
- Smittskydd och vårdhygien
  - Statistik Smittskydd
  - Vårdhygien
  - Vaccination
  - Sexuellt överförda infektioner (STI)
  - STRAMA
  - Smittskyddsenmilien och paragrafenmilien
  - Smittskyddsblad
  - Multiresistenta bakterier
  - Riktlinjer och rutiner
  - Barn i förskolan
  - Nyheter Smittskydd och vårdhygien
  - Kontakta Smittskydd och vårdhygien
  - Länkar
- Stöddgrupper för barn i sorg
- Tandvård
- Ungdomshälsa i Dalarna
- Vårdval Dalarna
- Utveckling och utbildning
- Samverkan
- Tjänster

Riktlinjer och rutiner smittskydd och vårdhygien

Samlade riktlinjer, rutiner och regler inom smittskydd och vårdhygien.

Asyl- och migrantsjukvård

- Användning av IGRA-test och TST (PPD).pdf
- Hälsoundersökning av flyktingar, asylsökande och migranter (pdf, 4 sidor)
- Latent tuberkulos (LTBI) -utredning rutin för handläggning av - PM (pdf, 6 sidor)
- Läkarundersökning av utlandsfödda barn - Rikshandboken barnhälsovård (extern webbsida)
- Tuberkulos - handläggning i samband med graviditet och BCG-vaccination av spädbarn (pdf, 7 sidor)

Blodsmitta

- Rutin vid nytt fall av hiv (pdf, 3 sidor)
- Stickskada eller annan händelse med risk för blodsmitta - åtgärder 15.pdf

Diarré

- Virusorsakad gastroenterit (pdf, 3 sidor, 22-09-30)
- Åtgärder vid tarminfektioner - lathund version 1.0 (pdf, 1 sida)
- Clostridioides difficile - checklista för vårdcentral 6.0 (1 sida, pdf)
- Diarré hos vårdpersonal - Provtagning efter utlandsvistelse.pdf

Hygienrutiner i vården

- Disk- och spoldesinfektor - kontroll av, 3 sidor, pdf
- Hantering av munskydd i vård och omsorg (pdf, 1 sida)
- Hygienregler Region Dalarna (pdf, 3 sidor, 230629)
- Instruktion andningsskydd (pdf, 1 sida)
- Kirurgiska ingrepp utanför operationsavdelning (pdf, 1 sida, 22-09-30)
- Kommunal vård Dalarna hygienriktlinjer (65 sidor, pdf)pdf
- Kylaggregat eller bordfläkt vårdhygieniska riktlinjer, 3 sidor, pdf
- Legionella vårdhygieniska riktlinjer (pdf, 3 sidor, 22-09-30)
- Operationsavdelning Vårdhygieniska riktlinjer (pdf, 7 sidor)
- Rengöring och desinfektion av ytor i vårdmiljö (pdf, 10 sidor)
- Skabb handläggning i vård och omsorg (pdf 3 sidor)
- Slutstädning Region Dalarna (pdf, 6 sidor)
- Smittsamma sjukdomar i vården (pdf, 13 sidor)
- Tuberkulos vårdhygieniska riktlinjer (pdf, 2 sidor)
- Vårdhandboken (extern webbsida)
- Vårdhygieniska riktlinjer vid användning av portabelt kylaggregat eller bordfläkt inom vård och omsorg (pdf, 2 sidor, 210708)
- Vägglåda (pdf, 4 sidor)
- Översikt över rekommenderade smittskyddsåtgärder mot covid-19 och andra luftvägsvirus i vård och omsorg (pdf, 3 sidor)

REGION DALARNA

Kommunal vård Dalarna
hygienriktlinjer

RIKTLINJE

2025-11-04

35 (64

Magsjuka

Bakgrund

Maginfektioner kan spridas okontrollerbart under lång tid om inga åtgärder vidtas. Överväg alltid om diarré/kräkning kan bero på infektion och därmed utgör en risk för smittspridning. Utbrott orsakade av Calicivirus är det som har störst vårdhygienisk betydelse.

Calicivirus - även kallad norovirus eller vinterkräksjuka

Symtomen kan vara illamående, kräkningar, diarré, buksmärtor, huvudvärk, yrsel och feber. Insjuknandet kan ske plötsligt utan föregående sjukdomskänsla. Inkubationstiden är vanligen kort 12-48 timmar. Sjukdomsförloppet varar oftast 1-2 dygn. Personal insjuknar ofta i samma utsträckning som vårdtagarna. Kortvarig immunitet. Smittade personer kan sprida smittan upp till två dygn, ibland längre, efter att de tillfrisknat.

Rotavirus

De vanligaste symtomen är diarré och kräkningar och inkubationstiden är 1-3 dygn. Sjukdomsförloppet varar oftast 4-6 dygn. Små barn liksom personer över 60 år tycks ha lättare att förvärva sjukdomen och får även allvarligare symtom. Personal har i regel god immunitet, varför endast ett fåtal insjuknar.


Smittvägar/Smittspridning:

- fekal-oral smittväg

Provtagning

- Ej rutinmässigt. Tas ofta på några vårdtagare initialt vid utbrott för att fastställa orsaken.
- Avföringsprov. PCR.

[Provtagningsanvisningar - Region Dalarna]



Vad räknas som utbrott?

Om två eller flera vårdtagare och/eller personal insjuknar med kräkningar och/eller diarréer i nära anslutning till varandra.

Ju längre man väntar med åtgärder desto svårare blir det att begränsa smittspridningen

Agera redan vid första fallet!



AI genererad bild

Vid utbrott

- Dagliga möten/rapporter
- Registrera insjuknade vårdtagare och personal med insjuknandedatum, symtom och vårdplats
- Dokumentera vidtagna åtgärder (se riktlinje virusorsakad gastroenterit)
- Kontakta/informera/checka av med Vårdhygien



AI genererad bild

Smittförebyggande arbete inom ordinärt boende

Väska

Möjlighet att göra tvätta händerna



AI genererad bild

Städning

Mathantering

Mathantering

- Vid utbrott – servera mat till alla vårdtagare på rummet
- Avdela speciell personal till mathantering (ska ej delta i omvårdnaden)
- Inga bufféer varken till personal eller vårdtagare
- Kassera misstänkt kontaminerat livsmedel
- Disk diskas i diskmaskin



AI genererad bild

Information

- Sätt upp information om ”magsjuka”
- Informera övrig personal, t.ex. städ, kök
- Undvik att flytta smittsamma vårdtagare till andra enheter!
- Vid behov av annan vård, informera mottagande enhet
- Uppmana patienterna att tvätta händerna ofta
- Besökare
  - Informera om att det pågår ett utbrott och att det är olämpligt att samtidigt besöka andra enheter på grund av smittrisken
  - Informera om vikten av god handhygien för att förhindra smittspridning



AI genererad bild

Personal

- Personal med symtom bör skickas hem. Kan återgå i tjänst:
- - 24-timmars symtomfrihet. Får inte hantera livsmedel (tabletter) första dygnet
- - 48-timmar efter symtomfrihet.

- Vid utbrott bör personal ej gå mellan olika avdelningar



AI genererad bild

Omhändertagande av spill = punktdesinfektion

- Spill av avföring och kräkning – noggrann upptorkning. Desinfektion med Virkon 1 %. OBS! Inverkningstiden 10 minuter
- Mekanisk bearbetning





Korrekta städrutiner är viktiga för att förebygga och begränsa smittspridning!

- Noggrann mekanisk rengöring
- Daglig desinfektion av vårdtagarnära kontaktytor med Virkon 1 %. Vid synlig smuts skall ytdesinfektion föregås av rengöring med rengöringsmedel och vatten
- Golv rengörs med rengöringsmedel och vatten. Detta förutsätter att god punktdesinfektion utförts vid spill
- Informera städpersonalen
- Rengör/desinfektera städutrustningen
- Slutstäd efter 48h symtomfrihet

- **OBS! Gäller ej inom ordinärt boende**



AI genererad bild

Tvätt

- Tvättsäck på rummet
- Kontaminerad tvätt som skickas till tvätteriet läggs i vattenlöslig innersäck och därefter i gul risktvättsäck (kan skilja mellan olika tvätterier)



Avfall

- Avfallssäck på rummet. Tillslut väl
- Hanteras som konventionellt avfall



AI genererad bild

När isoleringen bryts

Slutstädning sker när isoleringen bryts efter 48 timmars stabil symtomfrihet eller när vårdtagaren flyttas från rummet.

Slutstädning:

- Noggrann mekanisk rengöring av rummet med allrengöringsmedel och vatten
- Desinfektion av ytor i vårdtagarens närhet med Virkon 1%, t.ex säng, madrass, sängbord, dörrhandtag mm.
- Moppgarn/flergångstrasor tvättas i 90 grader, rengör städutrustningen med virkon.

- **Vårdtagaren ska duscha, få rena kläder. Renbäddad säng.**



AI genererad bild

Stödmaterial till chefen



Webb-utbildning Förebygga och förhindra smitta - för chefer inom vård och omsorg


Socialstyrelsen

Minska risken för att smitta kommer in och sprids på äldreboenden

– checklista med reflektionsfrågor

Att hindra att smitta kommer in och sprids i äldreomsorgen är en stor utmaning. Risken kan minskas genom ett systematiskt förbättringsarbete. I det här dokumentet finns reflektionsfrågor och tips på olika teman som kan inspirera till förbättringsåtgärder – på kort och lång sikt.

Frågorna kan i stora delar vara relevanta för andra verksamheter på socialtjänstens område, såsom korttidsboenden och LSS-bostäder. Listan ska däremot inte ses som heltäckande för allt en verksamhet behöver ta i beaktande.

Smittan rör sig i första hand med människor

Det finns många vägar som smittor kan spridas till särskilda boenden, men i första hand kommer smittan med människor som för med sig smittor. Det kan till exempel handla om

- personer som bor på boendet men som gör ärenden utanför
- personer som flyttar in
- närstående som besöker boendet
- personal som är anställda på boendet
- personal som kommer till boendet för att utföra vissa uppgifter.


Under vinterhalvåret kan olika virus spridas i samhället, t.ex. säsongsinfluensa, covid-19, RS, calici-virus (vinterkräksjuka). Därför är det viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg håller i det smittförebyggande arbetet.

Det är viktigt att du som arbetar inom vård och omsorg alltid arbetar smittförebyggande och följer de basala hygienrutinerna.

Minska risken för att smitta kommer in och sprids på äldreboenden

Stödmaterial

[Webb-utbildning Förebygga och förhindra smitta - för chefer inom vård och omsorg]



Det här behöver du som chef säkerställa

Vad behöver du som chef då konkret göra enligt föreskriftens tre krav om rutiner, riskanalys och utbildning av personal?

Klicka på knapparna med rubriker för att läsa mer.



Säkerställ att det finns rutiner för din verksamhet

I rutinerna behöver bland annat det här finnas med:

- hur smitta ska förebyggas i verksamheten
- hur smittspridning ska förhindras i verksamheten
- vem som ansvarar för att olika smittförebyggande åtgärder vidtas i verksamheten
- hur verksamheten kan samverka med hälso- och sjukvården
- hur de smittförebyggande åtgärderna ska följas upp
- hur personalen i verksamheten ska informeras om rutinerna
- hur de som får insatser och deras närstående får information om hur verksamheten arbetar för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning.

Vad ingår i en riskbedömning?

Här får du lära dig mer om vad som ingår i en riskbedömning och var du vänder dig när du behöver mer stöd.

Klicka på knapparna med rubriker för att läsa mer.



Det här kan ingå ✓

Om du behöver stöd ^

Om du behöver stöd i bedömningen av smittorisken i din verksamhet samt när det gäller vilka processer och rutiner som behövs så kan du vända dig till:

- andra chefer i din organisation
- medicinskt ansvarig sjuksköterska
- vårdhygienenheten i den region som verksamheten tillhör
- smittskyddsenheten i din region.


Du kan även finna stöd i Arbetsmiljöverkets föreskrifter.


Stödmaterial



1.9	**Rutin finns för att förebygga och förhindra smitta och smittspridning i verksamheten** *Rutin finns för hur smitta och smittspridning förebyggs, vem som ansvarar för åtgärder, vägar för information och kommunikation samt hur samverkan sker med hälso- och sjukvården och andra aktörer.* *Smittrisker (AFS 2018:4), 3 § HSLF-FS 2022:44 (SoL, LSS), SKR Vägledning för vårdhygieniskt arbete, omr 1 och 2.*	☐	☐
1.10	**Handlingsplan finns som beskriver åtgärder vid misstanke om, eller bekräftad, smittspridning** *Skriftlig lokal handlingsplan finns för åtgärder vid misstanke om, eller bekräftad, smittspridning. Av handlingsplanen framgår områden som ansvarsfördelning, bemanning, informations- och kommunikationsvägar samt samverkan med hälso- och sjukvård och andra aktörer i verksamheten.*	☐	☐

Fyll gärna i utvärdering och kom med tips på ämnen för kommande utbildningstillfällen





Tack för idag!



REGION DALARNA