

Frågor och svar om vaccination covid-influensa 2023-2024

Frågor och svar om vaccinationerna mot covid-19 och influensa under säsongen 2023. Dokumentet riktar sig till vårdpersonal i Region Dalarna.

Innehåll

Vilka rekommenderas vaccin?	1
När börjar vaccinationerna?	1
Vilken rekommendation gäller för gravida?	2
Vilken rekommendation gäller för personer under 18 år?	2
Vilken rekommendation gäller för personal inom vård och omsorg?	2
Hur vaccineras vård och omsorgspersonal inom Region Dalarna?	3
Hur vaccineras vård- och omsorgspersonal i kommunerna?	3
Vad kostar vaccinationerna?	3
Vilka vaccin används i Dalarna?	3
Hur beställer man vaccinen?	4
Vilka vaccin kan ges samtidigt?	4

Vilka rekommenderas vaccin?

En lathund för vem som rekommenderas vilket vaccin hittas under [Smittskydd Dalarna: Influensa och covid-vaccination](#). Det finns också länkar till folkhälsomyndighetens sida med rekommendationer om vaccinen.

Observera att det finns skillnader i rekommendationerna mellan vaccinen.

När börjar vaccinationerna?

Nationell startdag för vaccination mot säsongsinfluensa och covid-19 är **tisdagen den 7 november**.

Två första veckorna prioriteras personer 65 år och äldre, medicinska riskgrupper under 65 år och hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar. Därefter, eller parallellt om utrymme finns, vård-/omsorgspersonal. Först när dessa grupper är klara kan allmänheten erbjudas vaccination, start kring 4 december.

Gravida som är sent i sin graviditet kan vaccineras mot covid-19 tidigare under hösten (se frågan *Vilken rekommendation gäller för gravida?*). Personer med nedsatt immunförsvar kan rekommenderas av sin läkare att vaccineras mot covid-19 tidigare under hösten.

Vilken rekommendation gäller för gravida?

Under hösten rekommenderas gravida en dos covid-vaccin (Comirnaty) efter graviditetsvecka 12, förutsatt att mer än 6 månader gått sedan senaste dos.

De som uppnår graviditetsvecka 20 innan vaccinstarten 7:e november bör vaccineras tidigare under hösten. Covid-19 cirkulerar redan nu och de får då ett gott skydd den period de har bäst nytta av det. De som uppnår graviditetsvecka 20 innan det uppdaterade covid-vaccinet finns tillgängligt rekommenderas att istället vaccineras sig med vaccinet som finns idag.

Gravida som tillhör en annan riskgrupp kan vaccineras innan graviditetsvecka 12.

Influensavaccin (Vaxigrip Tetra) rekommenderas som tidigare till gravida efter graviditetsvecka 12 och ges från vaccinstarten 7:e november

Comirnaty kan ges samtidigt som vaccin mot influensa (Vaxigrip Tetra) eller samtidigt som vaccination mot kikhosta (Triaxis). Till gravida rekommenderas inte att fler än två vaccin ges åt gången utan att de ska i så fall separeras med minst en vecka.

Vilken rekommendation gäller för personer under 18 år?

Influensavaccination rekommenderas till barn och ungdomar från 6 månader ålder som tillhör en medicinsk riskgrupp. (Se *Vem rekommenderas vaccin?*) Vaxigrip Tetra kan ges till barn från 6 månader. För personer i åldern 2-17 år kan också Fluenz Tetra, ett levande vaccin som ges som nässpray, användas. Då det är ett levande vaccin ska det inte användas vid immunbrist.

Covidvaccination rekommenderas endast i undantagsfall till personer under 18 år, efter individuell bedömning av ansvarig läkare. Mer information finns hos [barnläkarföreningen](#).

Hur vaccineras personer på SÄBO?

Boende på SÄBO som är över 65 år ska vaccineras med det förstärkta influensavaccinet Fluad Tetra, då det kan ge något bättre skydd för de sköraste. Boende på SÄBO rekommenderas också vaccin mot covid-19.

Kommunens personal räknar hur många vaccindoser som behövs och kontakter respektive vårdcentral för hjälp med beställning av vaccinen.

Kommunerna ska återrapportera givna doser till vårdcentralen så att det kan registreras i journalsystemet. För att kunna följa upp vaccinationsinsatsen vill vi att vaccinationerna återrapporterar och registreras minst 1 gång/vecka.

Vilken rekommendation gäller för personal inom vård och omsorg?

Personal inom vård- och omsorg rekommenderas att vaccinera sig mot influensa.

Vaccin mot covid-19 har inte visat sig skydda mot smittspridning på samma sätt som influensavaccin. Därför rekommenderas inte vaccin mot covid-19 till vårdpersonal på samma sätt som influensavaccin.

Personal som tillhör en riskgrupp följer rekommendationerna som gäller för riskgrupper. För den som inte rekommenderas covid-19-vaccin finns ändå möjlighet att få en dos om man önskar.

Hur vaccineras vård och omsorgspersonal inom Region Dalarna?

I första hand rekommenderas enheterna att själva beställa och ge influensavaccin till sin personal. Enheter har också möjlighet att beställa och ge vaccin mot covid-19 till personal som tillhör riskgrupp eller ändå önskar covid-vaccination.

De arbetsplatser som inte kan vaccinera sina medarbetare i egen regi kan hänvisa till den vårdcentral medarbetaren tillhör. Medarbetaren ta med sig e-tjänstekort eller lönebesked för att visa att man är regionanställd. Vaccinationen är då kostnadsfri för den anställda.

Information om hur vårdcentralerna debiterar för influensavaccination av regionens medarbetare kommer i en separat nyhet.

Hur vaccineras vård- och omsorgspersonal i kommunerna?

Kommunerna uppmanas i första hand att vaccinera sin egen personal mot influensa med tanke på att primärvården är belastad med både covidvaccinationer och vaccination mot influensa. Kommunen kontakter vårdcentralerna för beställning av vaccinet. Kommunerna har erbjudits att göra avrop på det Region Dalarnas avtal. Personal i kommuner som inte har avropat avtalet kan erbjudas vaccin om det finns tillräckligt. Vårdcentralerna kan också vaccinera kommunens personal på vårdcentralen. Arbetsgivaren ska stå för kostnaden för vaccination av personalen. Debitering för utlämnande av vaccin och för vaccination av kommunens vård- och omsorgspersonal sker enligt debiteringsunderlaget på [Smittskydd Dalarna: Influensa och covid-vaccination](#)

Vad kostar vaccinationerna?

Vaccin mot influensa är kostnadsfritt de som rekommenderas vaccin. För personal inom vård och omsorg rekommenderas arbetsgivaren att stå för influensavaccinkostnaden.

Peroner från Gävleborg, Västmanland, Södermanland, Uppsala, Örebro och Stockholm som vistas i Dalarna och har också rätt till kostnadsfri vaccination. Motsvarande gäller för personer från Dalarna, som vistas i nämnda regioner.

För de som ska betala för sin vaccination framgår avgiften i [Vårdavgiftshandboken>Vaccinationer](#)

Vaccin mot covid-19 är kostnadsfritt för alla som vistas i Sverige.

Vilka vaccin används i Dalarna?**Vaccin mot influensa**

Vaxigrip Tetra (Sanofi). Utan fast nål. Innehåller två influensa-A-stammar och två -B-stammar. Inget adjuvans är tillsatt och vaccinet är fritt från kvicksilver. Kan innehålla spår av ägg.

Fluad Tetra (Seqirus). Innehåller standarddos antigenmängd tillsammans med ett förstärkningsmedel – så kallat adjuvans. Adjuvans förstärker immunsystemets svar på vaccination. Kan innehålla spår av ägg. Godkänt för personer 65 år och äldre och ska endast användas till boende på SÄBO. Antalet upphandlade doser är beräknat för antalet personer boende på SÄBO och får inte användas till andra. Med anledning av detta är det viktigt att primärvården stämmer av med respektive SÄBO hur många doser de behöver och sedan gör en beställning enligt nedan.

Vaccin mot covid-19

I Dalarna används i huvudsak vaccinet Comirnaty (Pfizer) som är ett mRNA-vaccin. Under hösten finns vaccinet i en uppdaterad version (Comirnaty Omicron XBB.1.5) som ger bättre skydd mot nyare virusvarianter. Det uppdaterade vaccinet kan användas för primärvaccination.

I Sverige finns dessutom vaccinet och Nuvaxovid (Novavax) som är ett inaktiverat vaccin. Nuvaxovid vaccin rekommenderas endast till personer som är 31 år eller äldre.

Du kan läsa mer på [Folkhälsomyndigheten - Fakta om vaccinerna mot covid-19](#)

Hur beställer man vaccinen?

Influensavaccinen beställs via Oriola på order@oriola.com eller via oriola.com. Uppge referens "fyrklöver"

Vaxigrip tetra 10-pack utan nål (varunummer 527182)

Fluad tetra 10-pack utan nål (varunummer 518768)

Covid-vaccinen beställs via läkemedelsförsörjningen Lakemedel.Dalarna@regiondalarna.se med kopia till

Ida Blomqvist ida.blomqvistquintino@regiondalarna.se

Leverans av covid-19 vaccin sker tisdagar (förutom Särna och Sälen, torsdagar)

Beställning av covid-19 vaccin till kommande vecka ska ske SENAST tisdag veckan innan.

Vilka vaccin kan ges samtidigt?

Standarddos influensavaccin (Vaxigrip Tetra) och vaccin mot covid-19 (Comirnaty eller Nuvaxovid) kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccinerna ges då på olika injektionsställen, helst vardera armen eller benet.

Även vuxna gravida kan erbjudas standarddos influensavaccin vid samma tillfälle som vaccin mot covid-19.

Vaccination med adjuvanterat influensavaccin (Fluad Tetra) och vaccination mot covid-19 med Comirnaty kan ges till vuxna vid samma tillfälle. Vaccination med det adjuvanterade influensavaccinet Fluad Tetra och det proteinbaserade covid-19-vaccinet Nuvaxovid separeras med minst 7 dagar.

Standarddos influensavaccin kan ges samtidigt med vaccin mot covid-19 även till barn. Dock är det få barn under 18 år som ska ha vaccin mot covid-19.

Alla influensa- och covid-vaccin kan kombineras med vaccin mot pneumokocker. För pneumokockvaccination finns en regional riktlinje på [Smittskydd Dalarna: Riktlinjer vaccination](#)

I första hand rekommenderas av praktiska skäl att ge endast två vaccin vid samma tillfälle. Prioritera att ge vaccin mot influensa och covid-19 eftersom dessa sjukdomar är mer säsongsbundna till vinterhalvåret än pneumokockinfektioner. Det finns utrymme för ordinator och vaccinator att, i samråd med patienten, ge tre vaccin samtidigt. Troligen kan det ge en högre risk för övergående biverkningar när man ger tre vaccin samtidigt. För gravida och särskilt sköra patienter (dit t ex många på SÄBO ingår) rekommenderas därför att ge högst två vaccin vid samma tillfälle.

Vaxigrip tetra kan ges samtidigt som andra inaktiverade vaccin och med de flesta levande vaccin.

Covidvaccinen kan oftast kombineras med andra vaccin när de ges till vuxna. Det gäller t ex vaccin mot TBE eller HPV. Vid osäkerhet kan man separera vaccinationerna med en vecka.

Om två vaccin inte kan kombineras ska det gå minst en vecka mellan vaccinationerna.
