

Godkänt
2025-09-25Giltigt t.o.m
2028-09-25Versionsnummer
9.0

Diarienummer

Handläggning vid uppgiven överkänslighet i samband med vaccination mot Covid-19, influensa och pneumokocker

- Hälsodeklaration bedöms. I den efterfrågas allergier eller reaktioner på läkemedel, som har inneburit sjukhusvård. Vid oklarheter kring allergi tillfrågas läkare på den egna enheten.
- Influensavaccin innehåller viruspartiklar som har odlats fram på hönsägg. De som har haft anafylaxi vid intag av ägg remitteras till Lung-/Allergimottagningen, Falu lasarett. Vid annan överkänslighet mot ägg kan man vaccineras mot influensa.
- De som har haft en **svår allergisk reaktion*** mot allergen såsom **födoämnen, insektsstick, latex, läkemedel peroralt** (t ex antibiotika) eller andra ingående ämnen i vaccinet: samt patienter med systemisk mastocytos: *vaccineras på enhet där anafylaxiberedskap ska finnas med tillgång till syrgas och droppsättning vid behov. De skall kvarstanna i 30 minuter efter vaccination.*

Vaccination med 30 minuters observationstid ska i första hand ske:

- på vårdcentral eller annan enhet där man har den beredskapen.
 - Vid tveksamhet skickas konsultremiss till Lung-Allergimottagningen, Falu lasarett, för bedömning om vaccinationen bör göras på vårdcentral eller specialistmottagning.
- De som har haft en **svår allergisk reaktion*** mot vaccin eller annat injicerat läkemedel, eller tidigare reagerat med upprepade anafylaxier mot läkemedel: remitteras till Lung-Allergimottagningen, Falu lasarett, för bedömning.

*Med **svår allergisk reaktion avses**: journalfört vårdtillfälle p g a objektiv överkänslighetsreaktion, som varit så svår att den krävt behandling på akutmottagning/vårdcentral eller inläggning på sjukhus.