REGION DALARNA

RIKTLINJE

Godkänt 2026-11-20
Versionsnummer 7.0
Giltigt t.o.m 2029-11-20
Diarienummer

Lathund - Vaccination mot covid-19, influensa och pneumokocker säsongen 2026-2027

Ålder	Riskfaktor	Rekommenderas vaccination hösten 2026: Influensa	Rekommenderas vaccination hösten 2026: Covid-19	Pneumokocker (Prevenar 20® eller Capvaxive®) (om tidigare vaccinerad se nedan)
75+	**med riskfaktor**	Ja	Ja	Ja
75+	**utan riskfaktor**	Ja	Ja	Ja
65-74	**med riskfaktor**	Ja	Ja	Ja
65-74	**utan riskfaktor**	Ja	Bara om Säbo eller daglig hemtjänst	Ja
50-64	**med riskfaktor**	Ja	Ja	Ja
18-49	**med riskfaktor**	Ja	Bara om asteriskmärkt **Riskfaktor***	Ja
6-18	**med riskfaktor**	Ja	Bara om barnläkare rekommenderat	Ja (från 2 år)
Gravid efter graviditetsvecka 12		Ja	Nej	Nej
Hushållskontakt till person med kraftigt nedsatt immunförsvar		Ja	Nej	Nej
Övriga specifika indikationer för pneumokockvaccin				
Svetsare (från 18 år)				Ja
Cochleaimplantat (från 2 år)				Ja
Tidigare invasiv pneumokocksjukdom (sepsis eller meningit) (från 2 år)				Ja
Likvorläckage, aspleni/splenektomi, stamcells-transplantation, rökare				Se särskild riktlinje Pneumokockvaccination till riskgrupper

Åldersgränserna avser att de uppnås under innevarande år, dvs 75+ innefattar alla som fyller 75 år eller mer under 2026.

Covid-19: De som rekommenderas covid-19 vaccination kan avstå vaccinationom de haft bekräftad covid-19 efter 1 september 2026.

Riskfaktorer för influensa, covid-19 och pneumokocker (Grupperna är heterogena och individuell bedömning kan behövas)	
Kronisk hjärt-kärlsjukdomt	ex tidigare stroke, hjärtinfarkt eller kärlkramp (hypertoni som enda diagnos ingår inte)
Kronisk lungsjukdom	ex KOL eller svår, instabil astma
Tillstånd med nedsatt lungfunktion eller försämrad hostkraft och sekretstagnation.	t ex pga neuromuskulära sjukdomar, flerfunktionshinder eller extrem fetma
Diabetes mellitus	typ 1 eller typ 2
Leversvikt	
Downs syndrom*	
Njursvikt*	
Nedsatt immunförsvar pga behandling eller sjukdom*	pga organtransplantation, blodcancersjukdomar, *TNF-alfa-hämmare, höga doser kortison* eller annan immunhämmande behandling, sjukdom eller tillstånd.
Andra tillstånd som medför nedsatt kroppslig hälsa	t ex p g a psykisk sjukdom, demens, missbruk, flerfunktionsnedsättning

Tidigare vaccinerad mot pneumokocker	
***Med Prevenar20**	Ingen ny dos behövs
Med övriga vaccin (t ex Pneumovax, Prevenar13	Det ska gå minst 1 år innan Prevenar20 eller Capvaxive ges

***Riskfaktorer som medför covidvaccin-rekommendation även för 18-49- åringar** (inte bara för 50 år och äldre)

Upprättat av Ernlund Helena /Smittskydd och vårdhygien Dalarna /Falun
Godkänt av Ernlund Helena /Infektionssjukvård Falun /Falun
För verksamhet Hälso- och sjukvård Dalarna
Dokumentsamling