Vaccination mot influensa och covid 19 samt penumokocker 2026 och 2027 information till vaccinerande verksamheter

Nationell startdag för höstvaccinationerna blir **måndagen den 2 november**. Vaccinationsstarten är beräknad utifrån när influensasäsongen förväntas börja och inte utifrån covidläget. Risken för allvarlig sjukdom bedöms idag vara större vid influensa än vid covid-19. Rekommendationerna för covid- och influensavaccination är desamma som ifjol. De äldsta och sköraste erbjuds båda vaccinen. I år kommer alla även att erbjudas pneumokockvaccin (Prevenar20 eller Capvaxive) enligt det nya nationella vaccinationsprogrammet.

Vårdcentraler

De allra flesta vaccinationer sker på vårdcentralerna. I år behöver alla patienter aktivt boka sin tid själva där. Där erbjuds även covid- och pneumokockvaccin.

Sjukhusens mottagningar

Kan också beställa influensavaccin och erbjuda vaccination till patienter i riskgrupp i samband med andra vårdbesök.

Patienter som behöver covidvaccination hänvisas till vårdcentral. Anledningen är att förpackningarna med covidvaccin innehåller stora volymer och därför inte lämpar sig för beställning till varje enskild mottagning.

Vilka ska erbjudas vaccination?

Folkhälsomyndigheten: Länk till rekommenderade målgrupper

Samtidig vaccination mot covid-19 och influensa

- personer som är 75 år eller äldre
- personer som är 65 år och äldre med daglig omsorg i hemmet, till exempel via hemtjänst eller på särskilt boende (SÄBO)
- personer mellan 50 och 74 år som tillhör en riskgrupp
- Vissa personer 18-49 år med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vaccination mot enbart säsongsinfluensa startar vecka 47

- personer som är 65 år och äldre
- personer som är yngre än 50 år som tillhör en riskgrupp
- Närstående till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar.

Vaccination av vård- och omsorgspersonal

Startar några få veckor senare. Mer information till medarbetare och chefer kommer.

Vaccination mot pneumokocker

- Personer som är 65 år och äldre
- Personer yngre än 65 år som tillhör riskgrupp

Pneumokockvaccination till riskgrupper

Kontraindikationer

Överkänslighet mot de substanser som ingår i vaccinet (se *Innehåll* i FASS). Vaccinet kan innehålla spår av ägg, såsom ovalbumin, neomycin, formaldehyd och oktoxinol-9.
OBS! Även vuxna med äggallergi kan ges influensavaccin, med undantag för om man har reagerat med anafylaxi vid intag av ägg. Då bör personen remitteras till Lung-Allergimottagningen, Falu lasarett.
Vaccinationen bör skjutas upp vid måttlig eller allvarlig febersjukdom eller annan akut sjukdom.

Biverkningar

Det vanligaste är lokal ömhet och svullnad. Feber och sjukdomskänsla kan förekomma. Överkänslighetsreaktioner är sällsynta.

Ordination

Ordination och administrering av influensavaccination görs i vaccinationsmodulen i MittVaccin som nås via Cosmic. Se manual ”Ordinera covid-, influensa- och pneumokockvaccin”. **Ordinera vaccination mot covid och influensa och pneumokocker** samt **MittVaccin Rutin och handledning - MittVaccin**


Hälsodeklaration

Finns i MittVaccin.

Vaccination

Vaccinet ges intramuskulärt i deltoideusmuskeln på överarmen (se bild).





Vaccin

Influensa:

- **Fluarix**. Standarddos Fluarix utan fast nål beställs. Kanyl med stickskydd måste beställas separat.
- **Fluad** är ett högdos influensavaccin. Vaccinet ska endast användas till boende på SÄBO. Antalet upphandlade doser är beräknat för antalet personer boende på SÄBO och får inte användas till andra.

Covid:

- **Comirnaty XFG** Ampuller i 10-pack. Varje ampull ger 6 doser.
- Proteinbaserat vaccin: Bimervax XFG kommer att kunna beställas senare i höst.

Pneumokocker:

- **Prevenar20** eller **Capvaxive**. Alla riskgrupper rekommenderas *en* dos även om man har fått Pneumovax tidigare. Det bör gå ett år mellan Pneumovax och Prevenar20 eller Capvaxive.

Beställning av vaccin kan göras redan nu

Influensavaccin: Via Oriola: Tfn 0770 - 22 20 20 order@oriola.com
Covid 19 vaccin: lakemedel.dalarna@regiondalarna.se

Pneumokockvaccin: Via Oriola Tfn 0770 - 22 20 20 order@oriola.com
Länk: Lista över upphandlade vacciner

Samtidig vaccination

Både Fluarix och Fluad kan ges samtidigt som Comirnaty.
Vaccin mot pneumokocker kan också ges samtidigt med vaccin mot influensa och covid-19. Om flera vaccin ges samtidigt, ge i olika extremiteter. p g a ökad risk för lokala biverkningar.

Kostnad Influensavaccin

Vaccinationen är kostnadsfri för de grupper som rekommenderas vaccination. Detta gäller förutom personer från Dalarna även personer från Gävleborgs, Västmanlands, Sörmlands, Uppsala, Örebro och Stockholms län. Övriga betalar full avgift.

Kostnad Covid-19/Pneumokockvaccin

Vaccinationen är kostnadsfri för de grupper som rekommenderas vaccination.

Har du frågor om vaccination kan du kontakta:

vaccinsamordning.dalarna@regiondalarna.se

Länkar

Vaccination mot influensa — Folkhälsomyndigheten