

## Skyddsutrustning vid vaccination covid-19

### Vilken skyddsutrustning ska användas?

- **Munskydd** som "source control", för att skydda patienten/omsorgstagaren från droppar/stänk från personalens luftvägar.
- **Handskar** när man sticker.  
OBS! Handdesinfektion före och efter användning av handskar
- **Kortärmat plastförkläde**  
Används enbart om man behöver stå så nära patienten att man rör vid patient eller säng med sina arbetskläder.

### Hur ska man hantera skyddsutrustning?

- **Handskar** och eventuellt **förkläde** byts mellan varje patient.
- **Munskyddet** kan sitta på mellan patienterna, men ska bytas om det har blivit fuktigt eller om det har kommit stänk på det.

### Hur gör man på en avdelning där det finns patienter/boende med pågående covid-19-infektion?

Pfizers vaccin Comirnaty kan ges även om personen har en pågående covid-19-infektion. Vad som gäller för övriga vacciner vet vi inte förrän de har godkänts.

- Gå inte mellan sjuka och friska patienter "i onödan". Förslagsvis vaccineras alla friska först.
- Vid vaccination av person med misstänkt eller bekräftad covid-19 ska personal ha **både munskydd och visir** för att skydda sig själva.
- **Visir och munskydd** kan bäras mellan patienterna, förutsatt att de inte har kontaminerats (t ex med stänk eller om man har rört vid munskyddet/visiret).
- **Munskyddet** måste även bytas när det blir fuktigt.

- **Handskar** används vid själva sticket. De tas av direkt efteråt, följt av handdesinfektion. Handdesinfektion utförs även innan handskar tas ur förpackning.
- Eventuellt **plastförkläde** byts mellan varje patient.

Marie Thelander

Helena Ernlund

ST-läkare Vårdhygien

bitr. smittskyddsläkare