Godkänt: 2025-01-21 Ver.nr: 3.0
Giltigt t.o.m: 2028-01-21 Dnr:

Datortomografi hals larynx remittent

Dosklass II: Extra hänsyn till strålrisk för barn.

Indikation - Frågeställning

- Tumörer i naso-, oro- och hypopharynx
- Förstorade lymfkörtlar. Kolla gärna i detta dokument innan du beställer undersökningen (kortversion-svf-huvud-halscancer)
- Lymfom
- Cystor hos barn och ungdomar
- Abscess
- Spottkörtelförändringar. Konkrement
- Tracheal påverkan
- Larynxförändringar eller traumatiska skador
- Thyreoideaförändringar (Ultraljud i första hand)
- Esofagus eller trakea perforation. Spontan eller iatrogen
- Venösa tromboser. (Ultraljud i första hand)

Vid kärlfrågeställning på artärsidan utförs ultraljud med doppler eller DT-angiografi med kontrast.

Kontraindikationer

Kontrastmedelsöverkänslighet relativ kontraindikation. Premedicinering.
Premedicinering vid kontrastmedelsöverkänslighet.

Remissinnehåll

- Anamnes. Palpationsfynd. Skopisfynd. Om känd tumör ska typ och lokalisation av tumör anges. Tidigare operationer, stråt- och cellgiftbehandlingar
- Kreatininvärde

Patientförberedelser

- Plocka bort smycken, proteser eller tuggummi
- Grön eller rosa venflon i armvecket

Kontrastmedel/läkemedel

- Ibland per oral kontrast vid perforationsmisstanke. Dricks på röntgenavdelningen

Upprättat av: Nilsson Stefan H /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Falun
Godkänt av: Babic Mouna /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Dalarna
För verksamhet: Bild- och funktionsmedicin Dalarna
Dokumentsamling: Remittentanvisning BFM Remittentanvisning BFM

- I regel jodkontrast iv
- Kontrastmedel får ej ges om misstänkt/konstaterad thyreoideacancer och radiojodbehandling planeras

Det finns detaljerat flödesschema angående thyroidea sjukdomar och jodkontrastmedel. Den behöver detaljerad information angående aktuell behandling eller planerad behandling samt labprover. Var god se nedan flödesschema vid behov för att beställa undersökning utan eller med iv kontrast. Var god se nedan flödesschema vid behov Flödesschema thyroidea och jodkontrastmedel (slf.se).

Utförande

Undersöks i ryggläge med tunna snitt under kontrastinjektion. Om tandlagningar som ger artefakter görs en extra serie med öppen mun.

Om många stora tandlagningar ger artefakter och omöjliggör diagnostik kan MRT övervägas.

Eftervård

-