Godkänt: 2025-01-21 Ver.nr: 3.0
Giltigt t.o.m: 2028-01-21 Dnr:

Datortomografi tunntarm remittent

Dosklass IV: Extra hänsyn till strålrisk för alla åldrar

Indikation - Frågeställning

- Striktur - ileusorsak?
- Tumör
- Polyp
- Divertikel
- MB Crohn endast vid akut skede. I övriga fall MRT tunntarm.

Kontraindikationer

Kontrastmedelsöverkänslighet relativ kontraindikation. Premedicinering.
Premedicinering vid kontrastmedelsöverkänslighet.

Remissinnehåll

- Vad tidigare utredning har visat. Undersökningen utförs i regel som en mera klarläggande undersökning efter tidigare rutin DT buk
- Kreatinin

Patientförberedelser

- Fasta 4 timmar
- Grön eller rosa nål

Kontrastmedel/läkemedel

Patienten dricker 1,4 l sorbitollösning kontinuerligt under 45 minuter ända fram till undersökningen. T Primperan 10 mg ges för att stimulera tarmperistaltiken medan patienten dricker. Iv injektion Buscopan 20 mg ges direkt innan us för att dämpa tarmrörelser. Jodbaserad kontrast ges iv med tryckspruta.

Utförande

Hela buken undersöks i två serier med iv kontrast i sen artär- resp. venfas.

Eftervård

-

Upprättat av: Nilsson Stefan H /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Falun
Godkänt av: Babic Mouna /Bild- och funktionsmedicin Dalarna /Dalarna
För verksamhet: Bild- och funktionsmedicin Dalarna
Dokumentsamling: Remittentanvisning BFM Remittentanvisning BFM